

芽孢杆菌强化发酵降低小曲白酒中高级醇的含量

黄治国¹, 罗润森¹, 李彦中², 邓杰^{1,3}, 任志强^{1,3}, 卫春会^{1,3*}

(1. 四川轻化工大学酿酒生物技术及应用四川省重点实验室, 四川宜宾 644000) (2. 四川江口醇隆鼎酒业有限公司, 四川巴中 636400) (3. 中国轻工业酿酒生物技术及智能制造重点实验室, 四川宜宾 644000)

摘要:为探索芽孢杆菌的添加对小曲酒高级醇含量的影响,以13株大曲来源的芽孢杆菌为出发菌株,通过固态发酵和液态发酵,得到2株可降低小曲酒高级醇含量的芽孢杆菌;经过形态、生理生化及16S rDNA测序分析,鉴定菌株B8为地衣芽孢杆菌(*Bacillus licheniformis*),菌株B13为贝莱斯芽孢杆菌(*Bacillus velezensis*);将2株功能芽孢杆菌制成芽孢杆菌麸曲,进行小试和中试小曲白酒固态酿造试验,验证芽孢杆菌对小曲白酒风味物质的影响。结果表明,B8与B13强化发酵可明显降低高级醇含量,主要变为异戊醇与异丁醇的降低,以及微量正戊醇的产生,中试最高降低率可达29.87%,且低于某市售小曲清香型白酒成品酒中高级醇含量。该研究为解决小曲白酒中高级醇含量偏高问题提供了方法,以期提高小曲白酒质量。

关键词:芽孢杆菌;高级醇;液态发酵;固态发酵;发酵特性

文章编号:1673-9078(2023)02-145-151

DOI: 10.13982/j.mfst.1673-9078.2023.2.0251

Concentration of Higher Alcohols in Xiaoqu Liquor Induced by Enhanced Fermentation with Strains of *Bacillus*

HUANG Zhiguo¹, LUO Runsen¹, LI Yanzhong², DENG Jie^{1,3}, REN Zhiqiang^{1,3}, WEI Chunhui^{1,3*}

(1.Sichuan University of Science & Engineering, Liquor Brewing Biotechnology and Application Key Laboratory of Sichuan Province, Yibin 644000, China)

(2.Sichuan Jiang KouchunLongding Wine Industry Co. Ltd., Sichuan, Bazhong 636400, China) (3.Liquor Brewing Biotechnology and Intelligent Manufacturing Key Laboratory of China Light Industry, Sichuan, Yibin 644000, China)

Abstract: To explore the effect of *Bacillus* addition on higher alcohol content in Xiaoqu liquor, 13 *Bacillus* strains from Daqu were used as the starting strains. Through solid-state and liquid fermentation, two functional strains with the ability to reduce the higher alcohol content of Xiaoqu liquor were obtained. The strain B8 was identified as *Bacillus licheniformis* and strain B13 as *Bacillus velezensis* by morphological, physiological and biochemical analyses and 16S rDNA sequencing. The two functional *Bacillus* strains were used to make *Bacillus* fuqu, and small and medium scale solid-state fermentation experiments of xiaoqu liquor were carried out to verify the effect of *Bacillus* on the flavor substances of Xiaoqu liquor. The results showed that the enhanced fermentation with B8 and B13 could significantly reduce the contents of higher alcohols, which were mainly due to the reduction of isoamyl alcohol and isobutanol, and the production of trace n-amyl alcohol. The highest reduction rate for the pilot experiments reached 29.87%, which was lower than the contents of higher alcohols in the commercial finished liquor of Xiaoqu clear flavor liquor. The study provides a method for solving the problem of high content of higher alcohols in Xiaoqu liquor, which is expected to help improve the quality of Xiaoqu liquor.

Key words: *Bacillus*; higher alcohol; liquid fermentation; solid fermentation; fermentation characteristic

引文格式:

黄治国,罗润森,李彦中,等.芽孢杆菌强化发酵降低小曲白酒中高级醇的含量[J].现代食品科技,2023,39(2):145-151

HUANG Zhiguo, LUO Runsen, LI Yanzhong, et al. Concentration of higher alcohols in Xiaoqu liquor induced by enhanced fermentation with strains of *Bacillus* [J]. Modern Food Science and Technology, 2023, 39(2): 145-151

收稿日期: 2022-03-07

基金项目: 四川省科技厅应用基础研究项目(2019YJ0462); 四川江口醇隆鼎酒业有限公司院士(专家)工作站项目(HX2022065); 四川轻化工大学2021年研究生创新基金项目(y2021045)

作者简介: 黄治国(1978-),男,教授,研究方向: 酿酒生物技术及应用, E-mail: hzguo@suse.edu.cn

通讯作者: 卫春会(1980-),女,高级实验师,研究方向: 酿酒生物技术及应用, E-mail: 147516753@qq.com

白酒中高级醇是指三个及三个以上碳原子的一元醇,主要有异丁醇、异戊醇、异丙醇、正丙醇、正丁醇、 β -苯乙醇等,是白酒中的一类主要香味物质,也是一些香味成分的前体物质^[1,2]。适宜含量的高级醇能为白酒带来舒适的口感与芳香,过量的高级醇含量则会使白酒口感辛辣苦涩,还对人体健康具有不利影响,饮用高级醇含量较高的白酒更容易引起上头、恶心、眩晕等症状^[3,4],因此对白酒中高级醇含量的控制至关重要。

白酒行业大多按照 GB/T 5009.48-2003《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》中有关规定,以每 100 mL 饮料酒中高级醇含量不超过 0.15 g(以戊醇计)或 0.30 g(以异丁醇和异戊醇计)来评判酒中高级醇含量是否符合标准。我国 GB 2757-1981 规定白酒中高级醇含量不得高于 2.00 g/L,因国外蒸馏酒高级醇含量普遍偏高,我国 GB 2757 在 2012 年取消了对高级醇的限制要求。各类白酒在酿造中均会出现高级醇含量偏高的现象,倍受青睐的小曲白酒也不例外。对多种川法小曲酒、大曲清香、麸曲清香、米香型等白酒进行风味物质分析,发现小曲白酒高级醇含量相对较高^[5]。目前,受蛋白质分解机理影响,业内普遍认为正丙醇的产生与堆积料中的耐高温细菌有关^[6],已有研究表明酵母是高级醇的主要代谢微生物^[7,8],少数报道过芽孢杆菌产正戊醇、异戊醇等^[9]。芽孢杆菌是白酒酿造的重要功能菌,在大曲、窖泥和酒醅中广泛分布,为白酒酿造过程提供丰富的酶系,也对白酒风味物质的产生有重要的影响^[10,11]。芽孢杆菌在清香型小曲白酒的菌群中占有一定数量优势^[12],且地衣芽孢杆菌是清香型白酒中的产香功能微生物,可产较多乙酸乙酯,较少乳酸乙酯,符合清香型白酒“增乙降乳”的趋势^[13],理论上将芽孢杆菌运用到小曲白酒酿造中具有一定价值。

本研究从大曲来源的 13 株功能芽孢杆菌出发,通过实验室模拟液态发酵和固态发酵,对发酵产物的挥发性物质进行风味分析,从中筛选出强化发酵能降低高级醇含量的芽孢杆菌,并进行菌株鉴定。然后制成芽孢杆菌麸曲,将其运用到小曲白酒酿造的小试和中试试验,验证其发酵性能,探究芽孢杆菌的添加对降低酒体高级醇含量的影响。

1 材料与方法

1.1 材料

菌种:13 株芽孢杆菌均从大曲中筛选得来,现保存于酿酒生物技术及应用四川省重点实验室,编号 B1~B13;高粱、糠壳、小曲:市售;BacterialDNA

Isolation Kit 试剂盒,成都福际生物技术有限公司;正丙醇、异丁醇、异戊醇、正戊醇、苯乙醇(均为色谱纯),上海源叶生物科技有限公司。

1.2 仪器与设备

7890A-5975B 气相色谱质谱联用仪(GC-MS),美国安捷伦公司;M367983 PCR 仪、ChemiDocXPS+凝胶成像仪和 164-5070 电泳仪,美国 BIO-RAD 公司;A360 紫外可见分光光度计,上海翱艺仪器仪器有限公司;DM3000 生物显微镜,德国徕卡仪器有限公司。

1.3 方法

1.3.1 菌株筛选

1.3.1.1 种子液制备

将纯化的芽孢杆菌分别接入 LB 液体培养基培养基,于 37℃、120 r/min 培养 12 h,调节菌体 OD_{600nm}=1.0 (10⁸ CFU/mL),制成种子液,备用。

1.3.1.2 液态发酵

制备高粱营养液,将高粱粉 100 g(过 100 目筛)加入至 1 L 沸水中糊化 5 min,自然 pH。在 1 000 mL 广口瓶中加入 800 mL 高粱营养液,接种 0.4% (m/V) 市售小曲。取种子菌液 10 mL,6 000 r/min 离心 5 min,弃上清液,留菌体沉淀,用 10 mL 无菌水,分次洗下菌体至广口瓶中,密封发酵,置于 25℃ 恒温培养箱中发酵 7 d。

1.3.1.3 固态发酵

参照小曲清香白酒的酿造工艺^[14],以高粱为原料,用 100℃ 水浸泡 4~8 h 进行润粮,初蒸 15~20 min,焖粮 50~55 min,复蒸 60~70 min,摊晾至 40~50℃,加入蒸好的糠壳 5% (m/V),添加 0.4% (m/V) 活化小曲,拌匀。25℃ 左右堆积 20~24 h,添加菌液于 1 000 mL 广口瓶,每瓶装 800 g 酒醅,密封,25℃ 恒温发酵 7 d。空白对照组仅添加 0.4% (m/V) 市售小曲进行发酵,试验组添加 0.4% (m/V) 市售小曲和 0.04% (m/V) 芽孢杆菌,芽孢杆菌接种方式参照 1.3.1.2 中的方法。

1.3.1.4 总酯和高级醇含量测定

采用气相色谱-质谱法(GC-MS)对发酵结果中的高级醇含量与酯含量进行分析^[15]。样品测定参照 GB/T 10345-2007《白酒分析方法》对酒醅进行处理后,取 900 μ L 样液于进样瓶中,加入 2 mg/mL 的 2-辛醇内标溶液和 3 mg/mL 乙酸戊酯内标溶液各 50 μ L,随后自动进样。

气相色谱条件:毛细管色谱柱为 DB-WAX(60.00 m $\times$ 0.25 mm $\times$ 0.25 μ m);进样口温度为 230℃;程序升温:36℃ 保持 13 min,以 6℃/min 升温至 200℃,保

持 5 min, 以 10 °C/min 升温至 230 °C, 保持 10 min; 运行时间共计 58.333 min; 载气: 99.999% 氦气, 流速为 1 mL/min。

质谱条件: 电子离子源 EI, 电子能量 70 eV, 采集模式全扫描, 质量扫描范围 20~550 u, 溶剂延迟 3 min, 离子源温度 230 °C, 四极杆温度 150 °C, 接口温度 230 °C。

1.3.2 菌株鉴定

1.3.2.1 形态特征观察

观察菌株的菌落形态, 并进行革兰氏染色及芽孢染色。

1.3.2.2 生理生化试验

针对芽孢杆菌菌种特性, 进行葡萄糖分解试验、甲基红 (MR) 试验、V-P 试验、过氧化氢酶 (触酶) 试验、淀粉水解试验、柠檬酸盐试验、硝酸盐还原试验进行生理生化指标测定。

1.3.2.3 16S rDNA 测序

使用 Bacterial DNA Isolation Kit 试剂盒提取所筛选菌株的基因组 DNA, 以此为模板, 以通用引物 27F、1492R 进行序列扩增, 反应体系为 25 μ L: 27F 引物 1 μ L、1492R 引物 1 μ L、MIX 酶 12.5 μ L、DNA 模板 1 μ L、ddH₂O 9.5 μ L。PCR 条件: 94 °C 预变性 5 min, 94 °C 变性 1 min, 50 °C 退火 1 min, 72 °C 延伸 2 min, 循环 30 次; 72 °C 延伸 10 min。PCR 产物经 1% 琼脂糖凝胶电泳, 用凝胶成像系统观察电泳条带, 确定有无目的性条带出现。然后将 PCR 产物寄往上海生工生物工程有限公司进行测序。测序完成后, 用 DNASTar 软件对测得的序列进行拼接及人工校正, 在 NCBI 数据网站的 GenBank 中进行 BLAST 比对分析, 选取序列相似性较高的标准菌株的基因序列, 使用 MEGA-X 软件进行系统发育分析, 采用邻接法构建系统发育树。

1.3.3 小曲白酒酿造试验

以麸皮为原料, 接种目标芽孢杆菌, 通过三级制曲的模式, 制备芽孢杆菌麸曲^[16]。参照小曲清香白酒固态酿造工艺进行小试、中试, 小试采用 5 L 发酵容器, 中试采用 50 L 发酵容器。试验组分别添加 0.4% 市售小曲和 0.04% 芽孢杆菌麸曲, 以只添加 0.4% 市售小曲为对照组, 按照 1.3.1.4 方法对发酵产物中的高级醇含量与酯含量进行分析, 验证菌株 B13 与 B8 在小曲白酒发酵中降低酒体高级醇含量的功能。

1.4 数据处理

数据均采用 $\bar{x} \pm S_d$ 的形式表示, 使用 SPSS 19.0 软件中的一般线性模型单因素 Duncan 法对数据进行

方差分析, 利用 Origin 软件进行作图。

2 结果与讨论

2.1 醇酯种类和高级醇代谢差异分析

功能菌株的开发与应用对于酿造行业来说, 能更好地调控白酒生产, 提高生产质量与产量。一般对于菌株的筛选多基于培养基的设计等, 但是对于酿酒生产来说, 这种试验过于理论化, 当投入实际生产时却往往效果不佳, 这大多是由于理论试验于实际生产的差距导致, 因此对于酿酒生产来说, 筛选发酵相关的菌株, 应采取发酵试验来进行筛选, 并且尽可能与实际生产工艺相符合, 才能更好地达到最初目的。通过固态和液态发酵试验研究 13 株菌参与发酵对醇酯类物质产生的影响, 对醇酯类物质数量的影响如图 1, 对高级醇含量的影响如图 2 所示。




图 1 13 株菌发酵产物中醇酯类种数比较

Fig.1 Comparison of alcohol ester species in fermentation products of 13 strains

注: 不同菌株液态发酵的差异用大写字母表示, 不同菌株固态发酵的差异用小写字母表示, 不具有相同字母表示差异显著 ($P < 0.05$); 同一菌株固态发酵与液态发酵的差异用*表示, *表示差异显著 ($P < 0.05$), **表示差异极显著 ($P < 0.01$, 下同)。

由图 1 可知, B2、B8、B9、B13 这四株菌与空白组相比, 无论在液态还是固态发酵条件下, 其发酵产醇酯类物质种数都显著高于空白组 ($P < 0.05$)。由图 2 可知, B8、B10、B13 在固、液发酵条件下, 其发酵产物中高级醇含量都显著低于空白组 ($P < 0.05$), 在确保醇酯类物质种数增加的情况下, 菌株 B8、B13 对高级醇含量的降低作用最显著, 液态发酵中, B8、B13 分别低至 1.070 mg/mL 和 1.03 mg/mL, 较空白组分别降低 0.71 和 0.75 mg/mL; 固态发酵中, B8、B13 分别低至 0.69 和 0.56 mg/mL, 较空白组分别降低 0.41 mg/mL、0.54 mg/mL。在液态发酵中可利用氮源少, 大多通过糖代谢途径生成较高浓度的高级醇^[17], 其高级醇含量普遍高于固态发酵, 与试验结果相符。

通常液态法制备的小曲白酒中高级醇含量为0.60~2.50 mg/mL, 固态发酵制备的小曲白酒中高级醇含量为0.50~1.80 mg/mL^[18], 菌株 B8 与 B13 参与发酵后, 高级醇含量在其正常范围内。




图2 13 株菌发酵产物中高级醇含量比较

Fig.2 Comparison of higher alcohol contents in fermentation products of 13 strains

由上述可知, 菌株 B8 与 B13 在液态、固态发酵过程中, 能保持小曲白酒主体风味的情况下, 增加醇酯类物质种数, 对降低小曲白酒高级醇含量作用明显, 这可能在一定程度上改善小曲白酒风味, 提高小曲白酒酒质。

2.2 芽孢杆菌鉴定

通过菌落形态观察、生理生化试验及 16S rDNA 测序分析方法, 对菌株 B8、B13 进行菌种鉴定。两菌株菌落特征及镜检如图 3 所示, B8 的菌落形状不规则, 呈白色不透明, 表面多褶皱, 中间凹陷, 靠近边缘有一圈隆起, 易挑起。菌株 B13 的菌落呈乳白色圆形, 不透明, 质感黏腻, 不易挑起, 表面光滑, 湿润有光泽, 边缘整齐。两菌株革兰氏染色与芽孢染色结果表明, 均为革兰氏阳性菌, 且菌体为杆状, 两菌株均产芽孢, 初步判定其为产芽孢杆菌。

生理生化试验结果如表 1 所示, 菌株 B8 葡萄糖分解、甲基红、V-P、触酶、淀粉水解、柠檬酸盐、硝酸盐还原、精氨酸双水解酶试验结果均为阳性, 菌株 B13 甲基红试验、柠檬酸盐试验与精氨酸双水解酶试验结果呈阴性, 其余结果呈阳性。菌株 B13 不能利用柠檬酸盐产生碱性化合物, 具有分解葡萄糖产酸的能力, 但分解葡萄糖产酸量较小, 或者产生的酸进一步转化为其它物质(如醇、酮、醚、气体和水等), 使得甲基红试验结果为阴性。两者均表现出良好的葡萄糖分解能力、淀粉水解能力, 说明两者均具有葡萄糖分解酶、淀粉酶, 推测两菌株在酿造环境中具有一定的生存能力。结合形态学观察, 根据《伯杰氏细菌鉴

定手册》^[19]初步判定菌株 B8、B13 为芽孢杆菌属。




图3 两株菌菌落特征图及镜检图

Fig.3 Microscopic examination of gram stain and spore stain of 2 strains

注: (1) B8-a 为菌株 B8 菌落图, B8-b 为菌株 B8 革兰氏染色结果, B8-c 为菌株 B8 芽孢染色结果; (2) B13-a 为菌株 B13 菌落图 B13-b 为菌株 B13 革兰氏染色结果, B13-c 为菌株 B13 芽孢染色结果。

表 1 两株菌的生理生化试验

Table 1 Tests of physiological and biochemical of the 2 strains

菌株	葡萄糖分解	甲基红	V-P	触酶	淀粉水解	柠檬酸盐	硝酸盐还原	精氨酸双水解酶
B8	+	+	+	+	+	+	+	+
B13	+	-	+	+	+	-	+	-

对 16S rDNA 测序结果进行分析, 使用 MEGA 7 构建系统发育树, 结果如图 4 所示。菌株 B8 与 *Bacillus licheniformis* 具有最大的序列相似性, 且发育树上处于同一个分支, 结合形态学观察与生理生化结果, 故将菌株 B8 鉴定为地衣芽孢杆菌(*Bacillus licheniformis*)。 *Bacillus velezensis* 与其相近种在生理生化上的区别包含精氨酸双水解酶为阴性, 结合菌株 B13 与 *Bacillus velezensis* 具有最大的序列相似性, 发育树上处于同一个分支, 故将菌株 B13 鉴定为贝莱斯芽孢杆菌(*Bacillus velezensis*)。

Bacillus licheniformis 是白酒酿造中贡献风味的重要微生物, 凌杰^[20]、孟醒^[21]等发现 *Saccharomyces* 通过产酸以及大分子的蛋白质类物质对 *Bacillus licheniformis* 生长形成抑制, 结合蛋白组学, 发现 *Bacillus licheniformis* 能影响酿酒酵母的乙醇、有机酸等物质代谢。推测 *Bacillus. licheniformis* 的添加可能影响高级醇的代谢途径, 从而起到降低高级醇的作用。 *Bacillus velezensis* 多应用于生物防治, 关于醇类代谢研究鲜有报道, 但是其为重要的酿酒功能微生物, 是白酒高温大曲的优势菌, 具有较高的产蛋白酶和产淀粉酶能力, 能通过调节代谢活性, 改变大曲的原生菌群、酶活性和风味成分^[22]。




图4 邻接法构建的B8、B13菌株16S rDNA序列系统发育树

Fig.4 Phylogenetic tree of strain B8 and B13 16S rDNA constructed by adjacency method

2.3 小试和中试固态酿造高级醇及总酯含量分析

小试试验可以对发酵过程进行更准确的控制,但中试试验是将实验室与生产连接的重要桥梁,是将科研成果转化为生产力的必经之路^[23]。两种芽孢杆菌麸曲的小试和中试酿造试验产总酯与产高级醇结果如图5、图6。总体上来看,两株芽孢杆菌以麸曲形式参与到固态酿造试验后,高级醇以及酯含量与对照组相比均存在显著性差异($P<0.05$),高级醇含量显著降低,酯类含量有明显提升。对于酯含量,两菌株分别参与发酵后,无论小试还是中试,其酯含量均高于空白组,主要表现为乙酸乙酯的增加,小试最高总酯含量为1.53 mg/mL,中试最高为1.20 mg/mL,两菌株之间对比无明显差异性。对于高级醇,菌株B13降低小曲白酒中高级醇含量能力稍优于B8,但无显著性差异,小试中高级醇含量最低达1.18 mg/mL,空白组为1.80 mg/mL,降低了34.44%,中试中最低达1.25 mg/mL,空白组为1.78 mg/mL,降低了29.87%,小试效果总体优于中试。由于在小试中可以准确控制发酵条件,在中试放大发酵时,增加了许多其它不可控的因素,致使中试降高级醇效果整体低于小试,但两轮次酿造试验都能显著降低小曲白酒高级醇的含量。由图7所示,异丁醇、异戊醇在接种芽孢杆菌麸曲的试验组产量降低最快,与只添加小曲发酵的对照组有显著性差异($P<0.05$),芽孢杆菌强化发酵后, β -苯乙醇总体呈现上升趋势,有微量的正戊醇产生,但其总高级醇含量显著低于空白组,说明2株芽孢杆菌在高级醇的调控均存在着密切的相互作用关系,这对高级醇的调控有一定的贡献。




图5 两种芽孢杆菌麸曲的小试酿造产总酯和高级醇含量情况


Fig.5 The contents of total esters and higher alcohols produced by two kinds of *Bacillus* bran koji in pilot fermentation

图6 两种芽孢杆菌麸曲中试酿造产总酯和高级醇含量情况


Fig.6 Contents of total esters and higher alcohols produced by two kinds of *Bacillusfuqu* in pilot fermentation

图7 中试酿造中主要高级醇产量对比分析

Fig.7 Comparative analysis of yield of main high alcohols in pilot brewing

目前关于小曲白酒中高级醇发酵调控的研究较少,曲冠颐等^[24]通过分析固态发酵过程中菌群合成高级醇的代谢差异特征,确定 *Saccharomyces*、*Pichia* 与 *Lactobacillus* 是调控小曲白酒高级醇含量的主要微生物。研究表明,直接参与高级醇代谢途径的相关基因如 BAT2 以及调控基因如 GATA 对高级醇合成具有重要影响,均可有效的调节酿酒酵母中高级醇的代谢^[25,26],结合芽孢杆菌能影响酵母产醇的代谢途径^[21],

由此推测功能芽孢杆菌的添加能降低高级醇的原因一方面可能是抑制了能调控高级醇生成的相关微生物的生长,造成菌群差异、代谢差异;另一方面可能是芽孢杆菌自身低产高级醇,然而酿酒酵母所产高级醇含量超出了芽孢杆菌对高级醇的耐受范围,产生反馈机制,对高级醇代谢进行调控。此外,芽孢杆菌参与发酵会使 β -苯乙醇含量增加和产生少量正戊醇。添加适量的 B8 和 B13 菌株到小曲白酒发酵能够降低高级醇含量,可能是强化菌株代谢了正戊醇或 β -苯乙醇等物质,这些醇类物质含量的增加改变或抑制了酵母代谢其它高级醇,但是目前还未有相关文献报道过正戊醇或 β -苯乙醇对高级醇的调控作用,在今后的试验中还需进一步验证。

由此可见, B8、B13 在小曲白酒酿造中均具有一定降低高级醇含量的能力,且其风味物质也有所增加,小试总体优于中试,但中试酿造环境更接近实际的生产情况,能有效的将科研成果转向生产。中试结果表明,菌株对高级醇含量最高降低率达 29.87%,且低于某市售小曲白酒,验证了芽孢杆菌强化发酵能有效的降低白酒中高级醇的含量,以期在实际生产中能加以运用。

3 结论

本文利用发酵试验筛选功能菌株,通过液态酿造和固态酿造试验,筛选得到 2 株可降低高级醇的优良菌株,分别为 B8(*Bacillus licheniformis*)、B13(*Bacillus velezensis*)。将功能菌株以麸曲的形式进行两轮次酿造试验,均能在维持小曲白酒主体风味的情况下,显著降低小曲白酒中高级醇的含量。中试酿造中,高级醇含量变化主要变现为异戊醇与异丁醇的降低,以及 β -苯乙醇的增加和微量正戊醇的产生,中试最高降低率可达 29.87%,且低于某市售小曲清香型白酒成品酒中高级醇含量。通过研究发现芽孢杆菌通过麸曲的形式应用到小曲白酒发酵中是可行的,同时对降低高级醇含量和改善酒质有一定作用,有较大应用潜力。后续将从芽孢杆菌代谢物质对高级醇的调控及微生物间的相互作用等两方面进行更深入研究,以此探究其降低高级醇的机理,以期为解决小曲白酒中高级醇含量偏高问题提供理论依据,提升小曲白酒品质。

参考文献

[1] HU Yuanliang, YANG Qing, CHEN Dong, et al. Study on microbial communities and higher alcohol formations in the fermentation of Chinese xiaqu baijiu produced by traditional and new mechanical technologies[J]. Food Res Int, 2020,

140:109876

[2] 周新虎,崔如生.引起白酒口干、上头问题的初探[J].酿酒科技,2001,5:44-45

[3] WANG Zhe, SUN Xizhen, LIU Yuancui. Characterization of key aroma compounds in xiaqu Liquor and their contributions to the sensory flavor [J]. Beverages, 2020, 6(3): 40-42

[4] Hazelwood L A, Daran J M, VanMaris A J, et al. The Ehrlich pathway for fusel alcohol production: a century of research on *Saccharomyces cerevisiae* metabolism [J]. Applied & Environmental Microbiology, 2008, 74(8): 2259-2266

[5] 曾祖训,赖永祥,曹炜,等.川法小曲白酒属小曲清香型白酒的研究-四川小曲酒香型确定的研究[J].酿酒科技,1992,5: 8-15

[6] 柏永昊,熊小毛,缪礼鸿,等.固态法发酵白酒中正丙醇产生的机理研究[J].中国酿造,2014,33(2):105-108

[7] Aragon p, Atienza J, Climent M D. Influence of clarification, yeast type, and fermentation temperature on the organic acid and higher alcohols of Malvasia and Muscatel wines [J]. American Journal of Enology & Viticulture, 1998, 49(2): 211-219

[8] 程显好,王晓红,屈慧鸽,等.不同酵母菌对白兰地挥发性成分的影响[J].中国酿造,2009,10:35-38

[9] 肖敏,王贵银,刘复今.高粱固态白酒发酵中菌类产生高级醇的研究[J].食品与发酵工业,1996,3:1-7

[10] WANG Yaping, SUN Zhongguan, ZHANG Cuiying, et al. Comparative transcriptome analysis reveals the key regulatory genes for higher alcohol formation by yeast at different α -amino nitrogen concentrations [J]. Food Microbiology, 2021, 95: 103713-103713

[11] ZHAO Xingxiu, LIU Yuanhao, SHU Li, et al. Study on metabolites of *Bacillus* producing soy sauce-like aroma in Jiang-flavor Chinese spirits [J]. Food Science & Nutrition, 2020, 8(1): 97-103

[12] 王海燕,唐洁,徐岩,等.清香型小曲白酒中微生物组成及功能微生物的分析[J].酿酒科技,2012,12:48-52

[13] 刘志磊.清香型白酒发酵过程主要功能微生物代谢特性研究[D].郑州:河南工业大学,2011

[14] 宗绪岩.小曲白酒生产技术[M].北京:化学工业出版社,2019: 30-40

[15] 王海瑞,陈军.气相色谱内标法测定白酒中高级醇与酯类[J].农产品加工(学刊),2014,15:55-56

[16] 四川轻化工大学.一种芽孢杆菌混菌麸曲及其制备工艺、应用:CN201911177646.6[P].2020-02-07

[17] 王亚平,邢爽,孙中贯,等.液态法大曲酒发酵过程中高级醇

- 影响因素的研究[J].天津科技大学学报,2019,34(5):39-44
- [18] 孙中贯,刘琳,王亚平,等.酿酒酵母高级醇代谢研究进展[J].生物工程学报,2021,37(2):429-447
- [19] RE Buchanan, N E Gibbons.伯杰氏细菌鉴定手册[M].8 版.北京:科学出版社,1984:729-758
- [20] 凌杰,吴群,徐岩,等.酱香型白酒发酵中地衣芽孢杆菌与酿酒酵母的相互作用[J].微生物学通报,2013,40(11):2014-2021
- [21] 孟醒,吴群,徐岩.酿酒酵母与地衣芽孢杆菌相互作用及基于蛋白组学的作用机制分析[J].微生物学通报,2015,42(9):1679-1688
- [22] HE Guiqiang, DONG Yi, HUANG Jun, et al. Alteration of microbial community for improving flavor character of Daqu by inoculation with *Bacillus velezensis* and *Bacillus subtilis* [J]. LWT, 2019, 111:1-8
- [23] 苏宁,李双石,严斌,等.河北产区优选酿酒酵母的中试研究[J].中国酿造,2011,6:34-37
- [24] 曲冠颐,唐洁,姜健,等.小曲清香型白酒发酵过程微生物菌群合成高级醇代谢特征[J].食品与发酵工业,2021,47(11):32-37
- [25] WANG Yaping, LIU Lin, WANG Xueshan, et al. GAT1 gene, the GATA transcription activator, regulates the production of higher alcohol during wheat beer fermentation by *Saccharomyces cerevisiae* [J]. Bioengineering, 2021, 8(5): 61-61
- [26] 徐佳,黄雪芹,杨建飞,等.酿酒酵母中 BAT2 基因敲除对桑葚酒中高级醇的影响[J].食品与发酵工业,2021,47(19):133-139