

乳铁蛋白对肠道屏障保护作用的研究进展

吴洪亚, 高亚男, 王加启, 郑楠*

(中国农业科学院北京畜牧兽医研究所, 农业农村部奶及奶制品质量安全控制重点实验室, 农业农村部奶产品质量安全风险实验室(北京), 北京 100193)

摘要: 完整的肠道屏障是维持肠道健康的先行和必要条件。乳铁蛋白因其具有多种生物活性而备受推崇。近年来, 国内外大量研究报道了乳铁蛋白通过修复肠黏膜、调节免疫功能和肠道菌群等来维持肠道稳态。该研究主要对乳铁蛋白的生物学特性、乳铁蛋白对肠屏障的作用以及乳铁蛋白的应用进行了综述。

关键词: 乳铁蛋白; 肠道屏障; 保护作用; 免疫调节

文章编号: 1673-9078(2023)11-371-380

DOI: 10.13982/j.mfst.1673-9078.2023.11.1381

Advancements on the Protective Effect of Lactoferrin on the Intestinal Barrier

WU Hongya, GAO Ya'nan, WANG Jiaqi, ZHENG Nan*

(Key Laboratory of Quality & Safety Control for Milk and Dairy Products of Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Laboratory of Quality and Safety Risk Assessment for Dairy Products of Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Institute of Animal Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, China)

Abstract: An intact intestinal barrier is a prerequisite for maintaining gut health. Lactoferrin is prized for its diverse biological activities. In recent years, numerous studies at home and abroad have reported that lactoferrin promotes intestinal homeostasis by repairing the intestinal mucosa, regulating immune functions, and modulating the intestinal flora. This study primarily reviews the biological characteristics of lactoferrin, its effect on the intestinal barrier, and its applications.

Key words: lactoferrin; intestinal barrier; protective effect; immunoregulation

引文格式:

吴洪亚,高亚男,王加启,等.乳铁蛋白对肠道屏障保护作用的研究进展[J].现代食品科技,2023,39(11):371-380

WU Hongya, GAO Yanan, WANG Jiaqi, et al. Advancements on the protective effect of lactoferrin on the intestinal barrier [J]. Modern Food Science and Technology, 2023, 39(11): 371-380

肠道是人体主要的消化器官,具有双重作用,一方面参与对营养物质的吸收和转运,维持机体健康,另一方面也能抵抗有害物质进入机体后造成的损伤和功能障碍^[1]。肠道屏障系统包括肠上皮细胞和紧密连接在内的物理屏障,以免疫细胞和细胞因子为主的免疫屏障,以肠道菌群为主的生物屏障和以黏蛋白和抗菌肽为主的化学屏障。研究发现,由

收稿日期: 2022-10-31

基金项目: 中国农业科学院科技创新工程(ASTIP-1AS12); 财政部和农业农村部: 国家现代农业产业技术体系(CARS36)

作者简介: 吴洪亚(1995-),女,硕士研究生在读,研究方向: 奶产品营养功能评价, E-mail: wuhongya0304@163.com

通讯作者: 郑楠(1980-),女,博士生导师,研究方向: 奶产品风险评估与营养功能评价, Email: zhengnan@caas.cn

于应激、感染和病原体入侵等引起的肠道屏障功能失调与多种疾病有关,如炎症性肠病、肠应激综合症、腹腔疾病和糖尿病等^[2,3]。近年来,有逐步增多的利用乳铁蛋白等天然产物达到保护肠道屏障的研究^[4-6]。

乳铁蛋白(Lactoferrin, LF)是一种非血红素铁结合糖蛋白,属于转铁蛋白家族,存在于包括乳汁、唾液和精液等生物体液中^[7],作为食源性天然产物,具有多种生物学活性。近年来研究发现 LF 通过修复肠黏膜、增强免疫功能以及调节肠道菌群等来维护肠道健康,对肠道物理、免疫、生物和化学屏障均有一定的保护作用。因此,本文基于最新的研究成果,主要对 LF 的生物学特性,LF 对肠道屏障的作用和机制以及 LF 的应用进行了综述。

1 乳铁蛋白的生物学特性

1.1 乳铁蛋白的分布

LF 广泛存在于人乳和牛乳中,其中人初乳中含量高达 5 g/L,牛初乳中含量为 1~3 g/L。随着泌乳时间的延长,哺乳动物合成 LF 的能力逐渐减弱,在成熟母乳中含量约为 2~3 g/L,成熟牛乳中含量仅为 0.03~0.49 g/L^[8]。LF 在猪、马、山羊和兔子等乳中的含量较人乳和牛乳低的多。此外,哺乳动物的唾液、泪液、精液、血液、胆汁和滑液等体液中同样存在 LF,但其含量甚微^[9]。

1.2 乳铁蛋白的结构




图 1 乳铁蛋白的三维结构图

Fig.1 Three-dimensional structure of lactoferrin

LF 分子量约为 80 ku,是由 690 个左右的氨基酸残基组成的单一多肽链。目前来源于人、鼠、牛、马、猪、山羊、绵羊、水牛和骆驼乳中的 LF 氨基酸序列已被报道,其中牛乳 LF 含有 703 个氨基酸残基,与人乳中的氨基酸序列具有高达 69%的同源性^[10]。LF 的单一多肽链折叠成两个基本对称且高度同源的结构域(N 端结构域和 C 端结构域),每个结构域分别包含两个亚结构域,即 N-1、N-2、C-1、C-2,铁离子的

结合位点位于每个结构域间缝隙内(图 1)^[11]。每个 LF 可结合两分子 Fe^{3+} 和两分子 HCO_3^- 或者 CO_3^{2-} 。根据结构上铁结合量的不同(2 个、1 个或无铁离子),LF 理论上分为完全饱和型 LF(holo-LF)、不完全饱和型 LF(single-LF)和缺铁型 LF(apo-LF)三类,含铁量的不同,往往会影响其三维空间结构、生物学功能和热稳定性。

1.3 乳铁蛋白的生物学功能

LF 具有多种生理功能,如参与机体铁代谢^[12]、广谱抗菌^[13]、抗病毒^[14]、抗寄生虫活性^[15]、调节机体免疫力^[16]等。LF 还能螯合易引起氧化损伤的 Fe^{3+} ,发挥抗氧化作用^[17]。LF 对成骨同样具有重要作用,可以防止骨质流失,增强骨密度和骨强度^[18]。此外,LF 是一种具有实用价值的抗肿瘤药物,可以作为抗肿瘤药物治疗多种肿瘤,还可以作为免疫调节剂应用于肿瘤的辅助治疗。除对肿瘤有作用外,对糖尿病、心血管疾病等代谢紊乱的疾病也有一定的预防作用^[19,20]。除了以上提到的生物学功能外,有大量研究报道,LF 可通过调节肠上皮细胞的增殖和分化、显著促进肠道中益生菌和常驻共生菌的生长等途径促进肠道健康^[21,22]。

2 乳铁蛋白对肠道屏障的作用

LF 对肠道屏障的作用主要体现在以下几个方面:通过促进肠上皮细胞增殖、提高紧密连接蛋白的表达、改善肠道组织形态修复受损后的肠道物理屏障;通过激活肠道免疫细胞、调节细胞因子的分泌发挥对肠道免疫屏障的保护作用;通过正向调控肠道菌群的保护作用;通过增强黏蛋白表达以及调节抗菌肽的分泌来发挥对肠道化学屏障的保护作用。

2.1 乳铁蛋白对肠道物理屏障的作用




图 2 受损肠道物理屏障(a)和乳铁蛋白修复后的肠道物理屏障(b)

Fig.2 Damaged intestinal physical barrier (a) and intestinal physical barrier after lactoferrin repair (b)

如图2所示,物理屏障受损后,LF可从以下三个方面发挥对物理屏障的保护作用,分别为①促进肠上皮细胞增殖;②提高紧密连接蛋白的表达,修复紧密连接;③改善肠道组织形态,提高绒毛高度和隐窝深度的比值。

2.1.1 肠道物理屏障的结构功能

肠道物理屏障由单层柱状上皮细胞以及上皮细胞之间的多蛋白复合物—紧密连接组成,它们位于细胞旁间隙的顶端区域,控制分子通过跨细胞和细胞旁途径的运输,是肠道抵御外来污染的第一道屏障^[23]。各种危害因子都会影响肠道物理屏障的维持,一旦其功能失调或“渗漏”,内毒素和细菌等有害物质就会渗透到血流中,对机体造成严重伤害,甚至会引起疾病^[24]。其中,肠上皮细胞(Intestinal Epithelial Cells, IECs)在食物消化、营养吸收(如离子、水、糖、肽和脂质)、保护人体免受微生物感染等方面发挥重要作用^[25]。细胞旁的空隙被紧密连接(Tight Junction, TJ)所封闭,由复杂的蛋白质相互作用网络维持^[26]。TJ是调节物理屏障的关键,由不同的连接分子组成,如跨膜蛋白(闭合蛋白 Claudin、咬合蛋白 Occludin 和连接黏附分子)以及细胞质支架蛋白(闭合小环蛋白, Zonula Occludens, Zos),调节相邻细胞中水、离子和大分子的细胞旁通透性,其功能障碍与多种局部和全身疾病有关^[27]。

2.1.2 乳铁蛋白促进肠上皮细胞增殖

肠上皮是人体最大的黏膜表面,覆盖约 400 m² 的面积,单层细胞组织成隐窝和绒毛。在黏液层下方,IECs 形成了连续的物理屏障,保护宿主免受感染和持续暴露于潜在的炎症刺激。Caco-2 细胞源自于人结肠癌细胞系,其表现出许多与小肠上皮细胞相似的特性,具有微绒毛结构、刷状边缘以及细胞间紧密连接等,是目前应用最广泛、最经典的模型之一。研究发现,牛 LF 和人 LF 均能促进体外 Caco-2 细胞增殖,这可能归因于细胞凋亡的减少^[28]。凋亡被发现与自噬密切相关,过度自噬会导致细胞凋亡的增加。LF 可通过抑制过度自噬减少黄曲霉毒素诱导的 IECs 凋亡,具体表现在 caspase-3、caspase-9 等凋亡蛋白的表达量降低^[29]。此外,LF 可以通过减少丝裂原活化蛋白激酶途径介导的氧化应激来减轻 IECs 的细胞毒性和 DNA 损伤^[30]。Nguyen 等^[31]发现,相比于高剂量(10 g/L)的 LF,低剂量(0.1~1 g/L)的 LF 可以更好地发挥有益作用,上调参与糖酵解、能量代谢和蛋白质合成的丙酮酸激酶、丙酮酸羧化酶和丙酮酸脱氢酶的表达,促进能量产生并有助于 IECs 增殖,这表明可能存在最佳的 LF 浓度。在鲜牛奶中提取纯化的 LF 主要呈 apo 形式,具有高度的铁结合能力,可以与人 IECs 结合并内

化^[32],且 apo-LF 可以激活细胞增殖的主要途径,即 ERK1/2 信号通路与 PI3K/Akt 信号通路^[33]。

2.1.3 乳铁蛋白提高紧密连接蛋白的表达

TJ 在靠近顶端表面的相邻上皮细胞之间形成一条连续的包围带,使相邻的细胞紧密贴合在一起,形成细胞间天然的物理屏障,防止微生物和其他抗原在上皮细胞旁扩散。研究表明,肠内补充 LF 可以上调 TJ 蛋白 Occludin 和 Claudin-4 的表达,降低肠道通透性,从而保持肠道完整性^[34]。此外,猪 LF 衍生肽 LFP-20 降低 MyD88 和 AKT 水平,抑制 NF- κ B 信号通路,调节脂多糖(Lipopolysaccharide, LPS)刺激过程中 TJ 蛋白闭合小环蛋白 1(Zonula Occludens 1, ZO-1)、Occludin 和 Claudin-1 的表达,可以用作保护肠道屏障功能的预防剂^[35]。在大鼠小肠隐窝上皮细胞 IEC-6 中,艰难梭菌毒素 B 导致 TJ 蛋白线性结构断裂明显,荧光显微镜下可见断续的线状片段,少见完整的网状结构,LF 使 TJ 蛋白结构恢复完整,显微镜下呈连续的线状带分布^[36]。

跨上皮电阻值(Trans-Epithelial Electrical Resistance, TEER)和细胞旁通透性通常被用来量化描述 TJ 的变化^[37]。目前这部分的研究多集中于体外 Caco-2 细胞模型。Hirotsu 等研究发现,400 μ g/mL 和 1 000 μ g/mL 的 LF 显著抑制 LPS 诱导的 Caco-2 细胞层 TEER 降低与细胞单层通透性的增强^[38]。与泌乳中期牛 LF 相比,泌乳早期牛 LF 可增加 Caco-2 细胞层的 TEER,这也与促炎细胞因子白细胞介素(Interleukin, IL)-8 的减少相关^[39]。Gao 等^[40]研究发现,黄曲霉毒素 M1 诱导 Caco-2 细胞旁通透性增加,100 μ g/mL 的 LF 预处理后,显著抑制细胞旁通透性的增加,改善肠屏障功能。

2.1.4 乳铁蛋白改善肠道组织形态

小肠上皮是由数百万个隐窝-绒毛结构组成的,绒毛是肠黏膜皱襞的指状突起,周围有称为隐窝的多处内陷^[41]。肠绒毛高度、隐窝深度以及两者的比值是衡量机体消化吸收功能的重要指标。其中绒毛高度与细胞数量呈显著相关性,绒毛变高时,肠上皮成熟细胞数量增加,与营养物质的接触和吸收面积增大,对养分的吸收能力增强。而隐窝深度的增加会减弱营养物质的吸收能力^[42]。相关研究表明,补充牛 LF 增加了小鼠空肠绒毛高度以及几种肠刷状边缘膜酶活性的表达^[28]。出生后 14 d 饲喂含有牛 LF 配方奶的仔猪,其空肠隐窝细胞显著增殖^[43]。此外,绒毛高度和隐窝深度的比值(V/C)综合反映了小肠的功能状态,比值下降表明黏膜受损,消化吸收能力下降。在断奶仔猪饲料中添加 250 mg/kg 和 500 mg/kg LF,十二指肠、空肠和回肠的 V/C 显著增加^[44]。




图3 乳铁蛋白发挥肠道免疫屏障保护作用的机制图

Fig.3 Mechanism diagram of lactoferrin exerting the protective effect of intestinal immune barrier

2.2 乳铁蛋白对肠道免疫屏障的作用

LF 发挥肠道免疫屏障的保护作用离不开其对免疫细胞和细胞因子的调节(图3),具体的作用机制如下所述。

2.2.1 肠道免疫屏障的结构功能

肠道被认为是人体内重要的免疫器官,肠道免疫屏障主要由肠道浆膜层免疫细胞与免疫细胞因子组成,可通过参与自然免疫和适应性免疫来维持局部和系统内稳态。其中,免疫细胞是免疫系统中的“看门人”,对于启动预防感染的保护性反应非常重要,主要包括T淋巴细胞、B淋巴细胞、巨噬细胞、树突状细胞(Dendritic Cell, DC)、自然杀伤细胞和浆细胞等^[45]。其中T淋巴细胞可分为CD4⁺T细胞和CD8⁺T细胞,介导病原体清除^[46],CD4⁺T细胞因功能的不同,又可以分为Th1、Th2、Th3、Treg、Tr1、Tfh、Th17、Th9和Th22等Th细胞亚群,这些细胞具有独特的发育和调节途径,在免疫和免疫介导的病理中发挥着独特的作用^[47]。除T细胞外,B细胞同样是适应性免疫系统的重要组成部分,其数量可以反映黏膜体液免疫的状态,在免疫系统中执行多重功能,包括递呈抗原,分泌抗体和各种细胞因子等^[48]。此外,细胞因子被认为在免疫系统中起着决定和调节作用,可以结合相应的受体调节细胞的增殖和分化,促进或抑制炎症反应^[49]。

2.2.2 乳铁蛋白激活肠道免疫细胞

受LF影响的主要免疫细胞群体为T细胞、B细胞和抗原呈递细胞(Antigen-Presenting Cells, APC),LF与免疫细胞之间的相互作用会对Th1和Th2反应、细胞因子微环境和体液反应的平衡产生显著影响^[50]。研究发现,口服LF与不同小鼠小肠固有层中CD4⁺T细胞、CD8⁺T细胞和IgM⁺B细胞、IgA⁺B细胞增加有关,而结肠中仅有CD8⁺T细胞显著增加^[51,52],表明

小鼠LF处理对每个区域的影响不同。Wei等^[53]研究发现,LF基因敲除小鼠的B细胞呈现早期发育障碍,其早期分化相关转录因子表达异常,同时还发现LF缺失会加剧B细胞相关疾病的病情,相应的补充LF具有减弱病症的疗效。APC,即单核细胞/巨噬细胞、DC等,对于维持组织稳态和对病原体的先天反应以及将先天免疫应答与适应性免疫应答联系起来至关重要。在LF的介导作用下,单核细胞在分化为DC的过程中触发耐受性程序,产生调节性细胞因子,抑制T细胞增殖,从而阻止了炎症反应,发挥强大的抗炎活性^[54]。

2.2.3 乳铁蛋白调节细胞因子的分泌

细胞因子在肠道免疫系统中发挥着重要作用,其中一部分具有抗炎作用,如IL-4和IL-10等,而另一部分则具有促炎作用,如肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factor, TNF)- α 、IL-6、IL-8和IL-1 β 等,多个体内和体外研究报告了LF对其表达的控制。TNF- α 是炎症性肠病和肠屏障功能障碍的诱发剂,已知它会引起细胞外凋亡,影响TJ结构,改变Claudin蛋白表达和亚细胞定位。Hering等^[55]利用两种不同的体外肠道细胞模型证明了在TNF- α 诱导的屏障功能扰乱期间,牛LF的屏障保护作用,包括恢复其TEER以及TJ蛋白的表达量。Hu等^[56]研究发现,在猪体外IPEC-J2细胞(小肠上皮细胞)模型中,LPS处理诱导IL-1 β 、IL-8与TNF- α 的分泌,降低IL-10的表达量,增加细胞通透性,并增强活性氧的产生。LF处理显著逆转上述趋势,可通过减弱NF- κ B/MAPK途径维持肠道屏障完整性,缓解LPS诱导的炎症反应。在大鼠小肠隐窝上皮细胞IEC-6与人Caco-2细胞中同样发现了上述现象^[57,58]。此外有研究表明,不同浓度的LF具有不同的炎症反应。低剂量LF通过细胞外信号调节激酶促进细胞增殖,限制IL-8分泌并阻止NF- κ B

和 HIF1 α 活化, 发挥抗炎作用, 缓解患坏死性小肠结肠炎的猪的疾病程度, 而高剂量 LF 则呈现相反的作用。推测可能是因为低剂量 LF 更有利于未成熟肠道发挥 LF-LPS 结合作用 (LF-LPS 复合物对许多病原体具有杀菌活性), 并限制过量未结合的 LF 刺激不必要的免疫反应^[59]。

2.3 乳铁蛋白对肠道生物屏障的作用

2.3.1 肠道生物屏障的结构功能

微生物遍布人体, 主要分布在外表面和内表面, 包括胃肠道、皮肤、唾液、口腔黏膜和结膜^[60]。最近的一项研究估计, 以年龄在 20~30 岁之间, 体质量 70 kg, 身高 170 cm 的人作为参考, 其体内的细菌总数为 3.8×10^{13} CFU^[61], 另外绝大多数细菌居住在结肠中, 估计约有 1 014 种^[62]。肠道菌群形成了一种相互依赖并与其他微生物相互作用的微生物系统, 其生态平衡形成了生物屏障, 而共生微生物群和致病微生物群之间的不平衡容易引起肠道菌群的失调, 导致感染以及各种代谢疾病。

2.3.2 乳铁蛋白正向调控肠道菌群的分布, 保护生物屏障

LF 通过破坏细胞膜的稳定性、螯合细菌所需要的三价铁、抑制微生物与宿主细胞的黏附和防止生物膜形成等机制具有广泛的抗菌活性。一系列体内和体外

研究揭示 LF 可以正向调控肠道菌群的分布, 发挥生物屏障保护作用 (表 1)。与喂养普通全脂牛奶相比, 喂食含重组人 LF 的牛转基因奶的仔猪其十二指肠至结肠的微生物多样性呈增加趋势, 结肠中沙门氏菌以及整个肠道中大肠杆菌的浓度降低, 回肠中的双歧杆菌和整个肠道中的乳酸杆菌的浓度也随着人 LF 的增加而增加^[63]。重组猪 LF 具有与上述同样的效果^[64]。此外, 无菌小鼠饮食牛奶中添加 2% 牛 LF, 可以显著抑制依赖碳水化合物肠杆菌科的增殖^[65]。体外研究发现, 牛 LF, 尤其是 apo-LF, 对体外食源性病原体的生长具有抑制作用, 对鼠李糖乳杆菌 ATCC 7469、罗伊氏乳杆菌 ATCC 23272、发酵乳杆菌 ATCC 11739、棒状乳杆菌 ATCC 25602、嗜酸乳杆菌 BCRC 14065、婴儿双歧杆菌 ATCC 15697、双歧杆菌 ATCC 29521 和乳酸片球菌 ATCC 8081 等 8 种益生菌菌株没有抑制作用, 可能是因为益生菌的特殊细胞结构或代谢物质保护细胞免受牛 LF 的活性影响^[66,67]。LF 对大肠杆菌不仅具有重要的抑制和杀菌效果, 还表现出强大的抗黏附作用, 可以抑制大肠杆菌对肠道上皮细胞和肠黏膜的黏附作用^[68]。此外, 即使在 pH 值为 2.5~3.5 的酸性条件下, LF 仍可对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌发挥较好地杀灭作用^[69]。以上提示我们 LF 或可作为潜在的益生元, 正向调控肠道菌群的分布, 为预防炎症性肠病和肠易激综合症等消化道疾病提供新的思路。

表 1 乳铁蛋白对肠道生物屏障的影响

Table 1 Effect of lactoferrin on intestinal biological barrier

乳铁蛋白(LF)类型	作用模型	影响	参考文献
重组人 LF	7 日龄新生仔猪	微生物多样性 $\uparrow$; 沙门氏菌、大肠杆菌 $\downarrow$; 双歧杆菌、乳酸杆菌 $\uparrow$	[63]
重组猪 LF	28 日龄断奶小母猪	沙门氏菌、大肠杆菌 $\downarrow$; 双歧杆菌、乳酸菌 $\uparrow$	[64]
牛 LF	无菌小鼠	抑制细菌增殖	[65]
apo-LF 牛 LF 水解物	益生菌菌株 食源性病原体	8 种益生菌菌株不受影响; 抑制食源性病原体的生长	[66]
牛 LF	益生菌菌株、病原体	所选益生菌不受抑制; 显著抑制病原体生长	[67]
牛 LF	人结肠癌细胞 Caco-2	大肠杆菌 O157:H7 $\downarrow$	[68]
LF (来源于粗奶酪乳清)	细菌菌株	大肠杆菌 $\downarrow$; 枯草芽孢杆菌 $\downarrow$	[69]

2.4 乳铁蛋白对肠道化学屏障的作用

经一系列体内和体外研究证明 (表 2), 乳铁蛋白主要通过增强黏蛋白表达以及调节抗菌肽的分泌来发挥对肠道化学屏障的保护作用。

2.4.1 肠道化学屏障的结构功能

肠道化学屏障主要指由肠黏膜上皮细胞分泌的抗菌相关蛋白质 (如黏蛋白和抗菌肽) 的黏液层, 该黏液层厚且复杂, 可防止肠道微生物与宿主肠上皮细胞的直接接触^[70]。其中, 黏蛋白是由一种特化的肠上皮

细胞-杯状细胞分泌,覆盖于肠道表面黏液层,促进了肠道内容物的清除,隔离并控制肠道微生物的入侵和定植,对维持肠道内稳态具有关键作用。此外,为了应对病原菌、真菌和寄生虫等的挑战,潘氏细胞产生了多种抗菌蛋白,其具有广泛不同的一级序列并能快速杀死或灭活微生物^[71]。

2.4.2 乳铁蛋白增强黏蛋白的表达

迄今为止,共鉴定出 22 种黏蛋白,主要分为两类:分泌性黏蛋白(MUC2、MUC5AC、MUC5B 和 MUC6 等)以及跨膜黏蛋白(MUC1、MUC3A、MUC3B、MUC4、MUC12 和 MUC17 等)^[72]。

黏蛋白在正常组织内稳态中起着至关重要的作用,一旦异常表达就会导致慢性炎症,甚至癌症^[73]。在小肠和大肠中,MUC2 是杯状细胞合成和分泌的主要分泌性黏蛋白。此前一项研究发现,MUC2 基因敲除小鼠在四周大时出现营养不良现象,微生物群落的丰度比正常小鼠更为复杂,且在第 178 天,出现慢性结肠炎、增生、腺瘤和腺癌,且结肠上皮细胞中促炎细胞因子显著增加^[74]。Wang 等^[75]用右旋糖酐硫酸钠(DSS)构建小鼠结肠炎模型,牛 LF 进行干预,发

现与单独 DSS 组相比,DSS 与牛 LF 联合处理组中 MUC2 显著升高,表明牛 LF 可以促进结肠黏膜的修复。此外,赵方舟^[76]对新生仔猪进行 LF 干预发现,其盲肠黏蛋白 MUC1 和 MUC4 的相对基因表达量显著提高,结肠黏蛋白 MUC4 的相对基因表达量同样出现了显著提高现象,在一定程度上提高了肠道化学屏障的防御功能。LF 同样可以提高体外模型 IPEC-J2 细胞中目标基因 MUC1、MUC4 和 MUC20 的表达量,可能是通过 MEK1/2 和 p38 信号通路来发挥肠道屏障保护作用,维持肠道环境的稳定^[77]。

2.4.3 乳铁蛋白调节抗菌肽分泌

抗菌肽具有抗菌和免疫调节特性,可保护肠道免受感染。目前关于 LF 影响肠道中抗菌肽分泌的报道并不多。相关研究发现, β -防御素 2(Human β Defensin 2, HBD-2)在细菌、TNF 和 LPS 等刺激下,其表达量会显著增强。而在结肠炎小鼠模型中,牛 LF 可显著抑制 HBD-2 的表达^[75]。王燕^[78]通过体内仔猪饲养实验发现,LF 可以提高抗菌肽(PMAP、Prophenin、PR-39 和 Protegrin-1)基因的表达,发挥屏障保护作用,在体外细胞实验中同样发现了上述结果。

表 2 乳铁蛋白对肠道化学屏障的影响

Table 2 Effect of lactoferrin on intestinal chemical barrier

乳铁蛋白(LF)类型	作用模型	影响	参考文献
牛 LF	小鼠结肠炎模型	MUC2↑	[75]
牛 LF	新生哺乳仔猪	盲肠 MUC1、MUC4↑, 结肠 MUC4↑	[76]
LF	猪空肠上皮细胞 IPEC-J2	MUC1、MUC4、MUC20↑	[77]
牛 LF	小鼠结肠炎模型	β -防御素(HBD-2)↓	[75]
LF	仔猪	抗菌肽(PMAP、Prophenin、PR-39、Protegrin-1)↑	[78]

3 乳铁蛋白的应用

肠道是一个复杂的环境,暴露于多种饮食成分。当前,人们越来越认识到饮食成分在基本营养之外发挥的各种有益作用,这也导致了功能性食品概念的发展。LF 是最具特征的多功能生物活性蛋白,鉴于其对肠道健康和宿主的整体福祉产生的有益影响,已经在以下几个领域得到了广泛应用。

3.1 婴儿配方奶粉

母乳被公认为是婴儿的最佳营养来源,但是全世界仍有大部分婴儿接受部分或全部婴儿配方奶粉的喂养,对于无法母乳喂养的婴儿,进一步改善婴儿配方奶粉的成分就显得格外重要。同时,因母乳中 LF 含量明显高于牛乳,所以刺激了在以牛乳为基础的婴儿配方奶粉中添加牛 LF 的趋势。

LF 对婴幼儿的健康益处被广泛熟知。一项前瞻性

研究显示,在中国四川省成都市 6 家妇幼保健院随机选取 260 名 4~6 个月的婴儿(前期为纯母乳喂养),分别喂养含牛 LF 的强化配方奶粉和不含牛 LF 的强化奶粉。结果显示,在纯母乳喂养的婴儿中,摄入含牛 LF 的强化乳与更高的全身铁含量和更有效的肠道铁吸收有关^[79]。同时,六项随机对照试验证明,LF 对极低出生体重婴儿的坏死性小肠结肠炎 II 期或 III 期和迟发性败血症具有有益作用^[80]。

LF 在 1939 年首次分离得到,而第一款销售的含牛 LF 的婴儿配方奶粉可追溯到 1986 年^[81]。2013 年起实施的,中国国标 GB 14880-2012《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》已将 LF 列为营养强化剂,允许其添加在婴儿配方奶粉中,添加量应小于 1.0 g/kg。遗憾的是,因 LF 分离纯化的难度以及价格高昂,中国近几年才开始逐渐在婴儿配方奶粉中添加 LF。但随着市场的发展,相信 LF 的添加技术会越来越成熟。

3.2 食品添加剂

来自牛乳的 LF 为人类所使用的主要 LF, 已被美国食品药品监督管理局 (FDA) 指定为公认安全的食品添加剂。作为天然抗菌剂, LF 可抑制食源性病原菌的生长, 如肠出血性大肠埃希氏菌 (O157:H7)^[82]、沙门氏菌^[83]、志贺氏菌等^[84]; 作为保鲜剂, LF 质量浓度超过 3 mg/mL 会令冷鲜肉表面呈现为亮红状态, 提高其色泽及感官效果, 其原因在于 LF 可以抑制氧化肌红蛋白的氧化速度, 保护高铁肌红蛋白的还原系统, 抑制丙二醛和硫代巴比妥酸的生成^[85]; 作为乳化剂, LF 与多酚生成的共价复合物可以提高 β -胡萝卜素乳状液的稳定性^[86]; 作为防腐剂, LF 已被 FDA 批准用于新鲜肉类, 可以有效防止微生物的生长, 延长货架保质期^[87]。

3.3 饲料添加剂

目前, 传统抗生素在养殖业滥用造成的药物残留等问题已成为困扰全世界的难题。而 LF 因其强大的生物活性, 被认为是一种极具开发潜力的绿色饲料添加剂。作为饲料添加剂, LF 的优点主要包括以下几点:

(1) 耐热性良好, 加工过程不易变性。牛 LF 的热变性温度为 70 °C, 且加热后, 其热稳定性高于山羊 LF^[88]。(2) 提高饲养动物免疫力与身体机能。研究表明, 市售的牛 LF 可作为有益的营养补充剂, 支持健康羔羊的免疫系统, 提高雏鸡的生产性能^[89,90]。(3) 增强饲养动物抗病能力。与其它的天然蛋白质和肽相比, 牛 LF 对于牛病毒性腹泻的疗效最高, 且在病毒感染的早期和整个过程中都有效^[91]。这也给相关企业和技术人员以启示, 如果能将 LF 广泛应用于动物饲养中, 其带来的经济效益和 market 价值将不容小觑。

4 结语

肠道是人体消化吸收的主要场所, 每天摄入食物的 99% 靠肠道吸收。因此, 一个完整的肠道屏障对肠道健康具有举足轻重的作用。肠道屏障功能出现异常会使不该进入体内的物质 (如病原菌和毒素等) 入侵, 造成消化吸收功能紊乱, 肠道内细菌、内毒素易位, 促进感染发生, 引发各种疾病。LF 作为一种多功能生物活性蛋白, 对保护肠道物理屏障、免疫屏障、生物屏障和化学屏障具有显著的效果。本文主要对乳铁蛋白作用于单独肠道屏障的作用进行了综述, 但随着研究的进一步深入, 不少研究者逐渐认识到, 肠道四种屏障并不是单纯独立地存在于肠道中, 而是互相影响, 协同参与宿主免疫反应。目前关于 LF 对四种屏障发

挥协同作用的相关研究还比较匮乏, 这也提示我们未来或许需要更多的基础研究和临床研究来揭示此部分的作用机制。相信在 LF 活性功能的不断阐明以及生产纯化工艺逐渐成熟的背景下, LF 将会进一步造福于食品加工业和畜牧业发展。

参考文献

- [1] Salim S Y, Söderholm J D. Importance of disrupted intestinal barrier in inflammatory bowel diseases [J]. *Inflammatory Bowel Diseases*, 2011, 17(1): 362-381.
- [2] Wang B, Wu G Y, Zhou Z G, et al. Glutamine and intestinal barrier function [J]. *Amino Acids*, 2015, 47(10): 2143-2154.
- [3] Groschwitz K R, Hogan S P. Intestinal barrier function: molecular regulation and disease pathogenesis [J]. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 2009, 124(1): 3-20.
- [4] Zhang J J, Wang J Q, Xu X Y, et al. Red ginseng protects against cisplatin-induced intestinal toxicity by inhibiting apoptosis and autophagy via the PI3K/AKT and MAPK signaling pathways [J]. *Food & Function*, 2020, 11(5): 4236-4248.
- [5] Cao S T, Wang C C, Yan J T, et al. Curcumin ameliorates oxidative stress-induced intestinal barrier injury and mitochondrial damage by promoting Parkin dependent mitophagy through AMPK-TFEB signal pathway [J]. *Free Radical Biology and Medicine*, 2020, 147: 8-22.
- [6] Xue M L, Ji X Q, Liang H, et al. The effect of fucoidan on intestinal flora and intestinal barrier function in rats with breast cancer [J]. *Food & Function*, 2018, 9(2): 1214-1223.
- [7] Baker E N, Baker H M. A structural framework for understanding the multifunctional character of lactoferrin [J]. *Biochimie*, 2009, 91(1): 3-10.
- [8] Wang B, Timilsena Y P, Blanch E, et al. Lactoferrin: Structure, function, denaturation and digestion [J]. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2019, 59(4): 580-596.
- [9] 孔莹莹, 杜明, 刘猛, 等. 乳铁蛋白理化性质及其成骨作用研究进展 [J]. *食品科学*, 2012, 33(21): 318-322.
- [10] 包晓宇, 陈美霞, 王加启, 等. 牛乳中活性蛋白生物学功能研究进展 [J]. *食品科学*, 2017, 38(19): 315-324.
- [11] García-Montoya I A, Cendón T S, Arévalo-Gallegos S, et al. Lactoferrin a multiple bioactive protein: an overview [J]. *Biochim Biophys Acta*, 2012, 1820(3): 226-236.
- [12] 柴灵莹, 陈科, 李华, 等. 强化乳铁蛋白配方奶粉对婴儿体格及红细胞指数的影响 [J]. *预防医学*, 2016, 28(7): 682-686.
- [13] Wilson B R, Bogdan A R, Miyazawa M, et al. Siderophores

- in iron metabolism: from mechanism to therapy potential[J]. Trends in Molecular Medicine, 2016, 22(12): 1077-1090.
- [14] 郑瑛. 乳铁蛋白干扰 EB 病毒与宿主细胞的结合及抑制 EB 病毒感染性炎症的机制[D]. 长沙: 中南大学, 2012: 59-69.
- [15] Diaz-Godinez C, Gonzalez-Galindo X, Meza-Menchaca T, et al. Synthetic bovine lactoferrin peptide Lfampin kills *Entamoeba histolytica* trophozoites by necrosis and resolves amoebic intracecal infection in mice [J]. Bioscience Reports, 2019, 39(1): BSR20180850.
- [16] Sfeir R M, Dubarry M, Boyaka P N, et al. The mode of oral bovine lactoferrin administration influences mucosal and systemic immune responses in mice [J]. Journal of Nutrition, 2004, 134(2): 403-409.
- [17] 李婷, 王彩云, 闫序东, 等. 乳铁蛋白体外抗氧化性的研究[J]. 食品科学, 2012, 33(21): 111-113.
- [18] Malet A, Bournaud E, Lan A, et al. Bovine lactoferrin improves bone status of ovariectomized mice via immune function modulation [J]. Bone, 2011, 48(5): 1028-1035.
- [19] Fernández-Musoles R, Castello-Ruiz M, Arce C, et al. Antihypertensive mechanism of lactoferrin-derived peptides: Angiotensin receptor blocking effect [J]. J Agric Food Chem, 2014, 62(1): 173-181.
- [20] Moreno-Navarrete J M, Ortega F J, Bassols J, et al. Decreased circulating lactoferrin in insulin resistance and altered glucose tolerance as a possible marker of neutrophil dysfunction in type 2 diabetes [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2009, 94(10): 4036-4044.
- [21] Wang W L, Cheng Z M, Wang X, et al. Lactoferrin, a critical player in neonate intestinal development: RHLF may be a good choice in formula [J]. J Agric Food Chem, 2021, 69(31): 8726-8736.
- [22] 魏秀秀, 陈庆森, 刘雪姬, 等. 乳铁蛋白对小鼠肠道微生物区系的影响研究[J]. 食品工业科技, 2013, 34(13): 333-337.
- [23] Dokladny K, Zuhl M N, Moseley P L. Intestinal epithelial barrier function and tight junction proteins with heat and exercise [J]. Journal of Applied Physiology, 2016, 120(6): 692-701.
- [24] Wang Y, Hong C, Wu Z, et al. Resveratrol in intestinal health and disease: focusing on intestinal barrier [J]. Front Nutr, 2022, 9: 848400.
- [25] Kong S, Zhang Y H, Zhang W. Regulation of intestinal epithelial cells properties and functions by amino acids [J]. Biomed Res Int, 2018, 2819154.
- [26] Buckley A, Turner J R. Cell biology of tight junction barrier regulation and mucosal disease [J]. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2018, 10(1): a029314.
- [27] Shin K, Fogg V C, Margolis B. Tight junctions and cell polarity [J]. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 2006, 22: 207-235.
- [28] Blais A, Fan C, Voisin T, Aattouri N, et al. Effects of lactoferrin on intestinal epithelial cell growth and differentiation: an *in vivo* and *in vitro* study [J]. Biometals, 2014, 27(5): 857-874.
- [29] Wu H Y, Gao Y N, Li S L, et al. Lactoferrin alleviated AFM1-induced apoptosis in intestinal NCM460 cells through the autophagy pathway [J]. Foods, 2021, 11(1): 23.
- [30] Zheng N, Zhang H, Li S L, et al. Lactoferrin inhibits aflatoxin B1- and aflatoxin M1-induced cytotoxicity and DNA damage in Caco-2, HEK, Hep-G2, and SK-N-SH cells [J]. Toxicon, 2018, 150: 77-85.
- [31] Nguyen D N, Jiang P, Stensballe A, et al. Bovine lactoferrin regulates cell survival, apoptosis and inflammation in intestinal epithelial cells and preterm pig intestine [J]. Journal of Proteomics, 2016, 139: 95-102.
- [32] Lönnerdal B, Jiang R, Du X. Bovine lactoferrin can be taken up by the human intestinal lactoferrin receptor and exert bioactivities [J]. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2011, 53(6): 606-614.
- [33] Jiang R, Lönnerdal B. Apo- and holo-lactoferrin stimulate proliferation of mouse crypt cells but through different cellular signaling pathways [J]. The International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 2012, 44(1): 91-100.
- [34] Wu J, Chen J, Wu W J, et al. Enteral supplementation of bovine lactoferrin improves gut barrier function in rats after massive bowel resection [J]. British Journal of Nutrition, 2014, 112(4): 486-492.
- [35] Zong X, Hu W Y, Song D G, et al. Porcine lactoferrin-derived peptide LFP-20 protects intestinal barrier by maintaining tight junction complex and modulating inflammatory response [J]. Biochemical Pharmacology, 2016, 104: 74-82.
- [36] Otake K, Sato N, Kitaguchi A, et al. The effect of lactoferrin and pepsin-treated lactoferrin on IEC-6 cell damage induced by clostridium difficile toxin B [J]. Shock, 2018, 50(1): 119-125.
- [37] Buchert M, Turksen K, Hollande F. Methods to examine tight junction physiology in cancer stem cells: TEER, paracellular permeability, and dilution potential measurements [J]. Stem Cell Reviews and Reports, 2012, 8(3): 1030-1034.
- [38] Hirotani Y, Ikeda K, Kato R, et al. Protective effects of lactoferrin against intestinal mucosal damage induced by

- lipopolysaccharide in human intestinal Caco-2 cells [J]. Yakugakuzasshi Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 2008, 128(9): 1363-1368.
- [39] Anderson R C, Bassett S A, Haggarty N W, et al. Short communication: Early-lactation, but not mid-lactation, bovine lactoferrin preparation increases epithelial barrier integrity of Caco-2 cell layers [J]. Journal of Dairy Science, 2017, 100(2): 886-891.
- [40] Gao Y N, Li S L, Yang X, et al. The protective effects of lactoferrin on aflatoxin M1-induced compromised intestinal integrity [J]. Int J Mol Sci, 2021, 23(1): 289.
- [41] Volk N, Lacy B. Anatomy and physiology of the small bowel [J]. Gastrointest Endosc Clin N Am, 2017, 27(1): 1-13.
- [42] Sumigray K D, Terwilliger M, Lechler T. Morphogenesis and compartmentalization of the intestinal crypt [J]. Dev Cell, 2018, 45(2): 183-197.
- [43] Reznikov E A, Comstock S S, Yi C, et al. Dietary bovine lactoferrin increases intestinal cell proliferation in neonatal piglets [J]. Journal of Nutrition, 2014, 144(9): 1401-1408.
- [44] 李美君, 方成堃, 张凯, 等. 饲料中添加乳铁蛋白对早期断奶仔猪生长性能、肠道菌群及肠黏膜形态的影响[J]. 动物营养学报, 2012, 24(1): 111-116.
- [45] Tomasello E, Bedoui S. Intestinal innate immune cells in gut homeostasis and immunosurveillance [J]. Immunol Cell Biol, 2013, 91(3): 201-203.
- [46] Laidlaw B J, Craft J E, Kaech S M. The multifaceted role of CD4(+) T cells in CD8(+) T cell memory [J]. Nature Reviews Immunology, 2016, 16(2): 102-111.
- [47] Dong C. Cytokine regulation and function in T cells [J]. Annu Rev Immunol, 2021, 39: 51-76.
- [48] Sabatino J J Jr, Pröbstel A K, Zamvil S S. B cells in autoimmune and neurodegenerative central nervous system diseases [J]. Nat Rev Neurosci, 2019, 20(12): 728-745.
- [49] Vazquez M I, Catalan-Dibene J, Zlotnik A. B cells responses and cytokine production are regulated by their immune microenvironment [J]. Cytokine, 2015, 74(2): 318-326.
- [50] Legrand D. Overview of lactoferrin as a natural immune modulator [J]. The Journal of Pediatrics, 2016, 173: S10-S15.
- [51] Wang W P, Iigo M, Sato J, et al. Activation of intestinal mucosal immunity in tumor-bearing mice by lactoferrin [J]. Japanese Journal of Cancer Research, 2000, 91(10): 1022-1027.
- [52] Ynga-Durand M, Tapia-Pastrana G, Rebollar-Ruiz X A, et al. Temporal dynamics of T helper populations in the proximal small intestine after oral bovine lactoferrin administration in BALB/c mice [J]. Nutrients, 2021, 13(8): 2852.
- [53] Wei L Y, Liu C, Wang J, et al. Lactoferrin is required for early B cell development in C57BL/6 mice [J]. Journal of Hematology & Oncology, 2021, 14(1): 58.
- [54] Puddu P, Latorre D, Carollo M, et al. Bovine lactoferrin counteracts Toll-like receptor mediated activation signals in antigen presenting cells [J]. Plos One, 2011, 6(7): 39-39.
- [55] Hering N A, Luettig J, Krug S M, et al. Lactoferrin protects against intestinal inflammation and bacteria-induced barrier dysfunction *in vitro* [J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2017, 1405(1): 177-188.
- [56] Hu P, Zhao F Z, Wang J, et al. Lactoferrin attenuates lipopolysaccharide-stimulated inflammatory responses and barrier impairment through the modulation of NF- κ B/MAPK/Nrf2 pathways in IPEC-J2 cells [J]. Food & Function, 2020, 11(10): 8516-8526.
- [57] Kong X Y, Yang M, Guo J, et al. Effects of bovine lactoferrin on rat intestinal epithelial cells [J]. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2020, 70(5): 645-651.
- [58] Aly E, López-Nicolás R, Darwish A A, et al. *In vitro* effectiveness of recombinant human lactoferrin and its hydrolysate in alleviating LPS-induced inflammatory response [J]. Food Research International, 2019, 118: 101-107.
- [59] Nguyen D N, Li Y, Sangild P T, et al. Effects of bovine lactoferrin on the immature porcine intestine [J]. British Journal of Nutrition, 2014, 111(2): 321-331.
- [60] Ogunrinola G A, Oyewale J O, Oshamika O O, et al. The human microbiome and its impacts on health [J]. Int J Microbiol, 2020, 8045646.
- [61] Sender R, Fuchs S, Milo R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body [J]. Plos Biology, 2016, 14(8): e1002533.
- [62] Candela M, Biagi E, Maccaferri S, et al. Intestinal microbiota is a plastic factor responding to environmental changes [J]. Trends Microbiol, 2012, 20: 385-391.
- [63] Hu W P, Zhao J, Wang J W, et al. Transgenic milk containing recombinant human lactoferrin modulates the intestinal flora in piglets [J]. Biochemistry and Cell Biology, 2012, 90(3): 485-496.
- [64] 汪以真. 猪乳铁蛋白基因克隆、表达及其产物对断奶仔猪生长、免疫和抗菌肽基因表达影响的研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2004.
- [65] Ogata T, Teraguchi S, Shin K, et al. The mechanism of *in vivo* bacteriostasis of bovine lactoferrin [J]. Advances in

- Experimental Medicine and Biology, 1998, 443: 239-246.
- [66] Chen P W, Jheng T T, Shyu C L, et al. Antimicrobial potential for the combination of bovine lactoferrin or its hydrolysate with lactoferrin-resistant probiotics against foodborne pathogens [J]. Journal of Dairy Science, 2013, 96(3): 1438-1446.
- [67] Tian H, Maddox I S, Ferguson L R, et al. Influence of bovine lactoferrin on selected probiotic bacteria and intestinal pathogens [J]. Biometals, 2010, 23(3): 593-596.
- [68] Yekta M A, Verdonck F, Broeck W, et al. Lactoferrin inhibits *E. coli* O157: H7 growth and attachment to intestinal epithelial cells [J]. Veterinární Medicina, 2010, 55(8): 359-368.
- [69] Elbarbary H A, Ejima A, Sato K. Generation of antibacterial peptides from crude cheese whey using pepsin and rennet enzymes at various pH conditions [J]. Journal of the Science of Food & Agriculture, 2019, 99(2): 555-563.
- [70] Mc Guckin M A, Lindén S K, Sutton P, et al. Mucin dynamics and enteric pathogens [J]. Nature Reviews Microbiology, 2011, 9(4): 265-278.
- [71] Mukherjee S, Hooper L V. Antimicrobial defense of the intestine [J]. Immunity, 2015, 42(1): 28-39.
- [72] Byrd J C, Bresalier R S. Mucins and mucin binding proteins in colorectal cancer [J]. Cancer and Metastasis Reviews, 2004, 23(1-2): 77-99.
- [73] Krishn S R, Kaur S, Smith L M, et al. Mucins and associated glycan signatures in colon adenoma-carcinoma sequence: Prospective pathological implication(s) for early diagnosis of colon cancer [J]. Cancer Letters, 2016, 374(2): 304-314.
- [74] Wu M N, Wu Y Q, Li J M, et al. The dynamic changes of gut microbiota in Muc2 deficient mice [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(9): 2809.
- [75] Wang S L, Zhou J Y, Xiao D, et al. Bovine lactoferrin protects dextran sulfate sodium salt mice against inflammation and impairment of colonic epithelial barrier by regulating gut microbial structure and metabolites [J]. Frontiers in Nutrition, 2021, 8: 660598.
- [76] 赵方舟.早期乳铁蛋白干预对哺乳仔猪后肠微生物组成和肠道功能的影响[D].南京:南京农业大学,2020.
- [77] 李贞明.三种饲料添加剂对仔猪肠道屏障功能的作用及机理研究[D].广州:华南农业大学,2017.
- [78] 王燕.PMAP、Prophenin 等猪抗菌肽基因表达的差异及乳铁蛋白对其表达的影响[D].杭州:浙江大学,2007.
- [79] Chen K, Zhang L, Li H, et al. Iron metabolism in infants: influence of bovine lactoferrin from iron-fortified formula [J]. Nutrition, 2015, 31(2): 304-309.
- [80] Pammi M, Suresh G. Enteral lactoferrin supplementation for prevention of sepsis and necrotizing enterocolitis in preterm infants [J]. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, 6(6): CD007137.
- [81] Wakabayashi H, Yamauchi K, Takase M. Lactoferrin research, technology and applications [J]. International Dairy Journal, 2006, 16(11): 1241-1251.
- [82] Weng T Y, Chen L C, Shyu H W, et al. Lactoferrin inhibits enterovirus 71 infection by binding to VP1 protein and host cells [J]. Antiviral Research, 2005, 67(1): 31-37.
- [83] Barreto Arce L J, Contreras García C A, Durand Vara D, et al. Lactoferrina bovina disminuye la invasión de *Salmonella enterica* en células HEP-2 Bovine lactoferrin decreases the invasion of *Salmonella enterica* to HEP-2 cells [J]. Rev Gastroenterol Peru, 2016, 36(4): 304-307.
- [84] Gomez H F, Ochoa T J, Herrera-Insua I, et al. Lactoferrin protects rabbits from *Shigella flexneri*-induced inflammatory enteritis [J]. Infection Immunity, 2002, 70(12): 7050-7053.
- [85] 王亚松,王泽,张红娇,等.天然保鲜剂在冷鲜肉保鲜中的研究进展[J].食品安全导刊,2021,34:141-143.
- [86] 刘夫国,王迪,杨伟,等.乳铁蛋白-多酚对 β -胡萝卜素乳液稳定性的影响[J].农业机械学报,2015,46(6):212-217,225.
- [87] 刁静静.生物防腐剂在肉品保鲜中的应用(二)-溶菌酶和乳铁蛋白[J].肉类研究,2009,4:53-61.
- [88] Sreedhara A, Flengsrud R, Prakash V, et al. A comparison of effects of pH on the thermal stability and conformation of caprine and bovine lactoferrin [J]. International Dairy Journal, 2010, 20(7): 487-494.
- [89] El-Ashker M, Risha E, Abdelhamid F, et al. Potential immune modulating properties and antioxidant activity of supplementing commercially available lactoferrin and/or *Lactobacillus* sp. in healthy Ossimi lambs [J]. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2018, 21(4): 705-713.
- [90] Badr H, Nabil N M, Tawakol M M. Effects of the prebiotic lactoferrin on multidrug-resistant *Escherichia coli* infections in broiler chickens [J]. Veterinary World, 2021, 14(8): 2197-2205.
- [91] Małaczewska J, Kaczorek-Lukowska E, Wójcik R, et al. Antiviral effects of nisin, lysozyme, lactoferrin and their mixtures against bovine viral diarrhoea virus [J]. BMC Veterinary Research, 2019, 15(1): 318.