

柴达木大肥菇多糖对小鼠的抗疲劳作用

焦迎春¹, 旷慧², 吴嘉南², 何成日³, 陈启和²

(1. 青海大学农牧学院, 青海西宁 810016) (2. 浙江大学食品科学与营养系, 浙江杭州 310058)

(3. 韩德秀平壤轻工业大学食品科学研究所, 朝鲜平壤)

摘要: 本文以柴达木大肥菇为研究对象, 采用热水浸提法提取柴达木大肥菇子实体多糖、发酵液多糖和菌丝体多糖, 并将三种多糖按照 100 mg/kg 的剂量分别灌胃小鼠 35 d, 灌胃结束后分析小鼠力竭游泳时间及力竭游泳结束后小鼠血液中氰化高铁血红蛋白 (hemoglobin, Hb)、血清中尿素氮 (blood urea nitrogen, BUN)、乳酸脱氢酶 (lactate dehydrogenase, LDH) 和乳酸 (lactic acid, LA) 含量、肝糖原 (hepatic glycogen, HG) 含量变化的差异性, 研究柴达木大肥菇多糖的抗疲劳作用。结果表明, 从子实体多糖 (polysaccharides from sporocarp, PS)、发酵液多糖 (polysaccharides from fermentation broth, PFB) 和菌丝体多糖 (polysaccharides from mycelium, PM) 中均分离得到 3 个多糖组分。PS 组、PFB 组和 PM 组小鼠的力竭游泳时间分别是空白对照组 (29.65±1.92 min) 的 1.93 倍、2.33 倍和 3.03 倍。PS、PFB 和 PM 均能提高小鼠血液中 Hb、血清中 LDH 含量和肝脏中 HG 含量, 降低小鼠血清中 BUN 和 LA 含量, 且 PM 的效果最明显, PM 组小鼠血液中 Hb、血清中 LDH、BUN、LA 和肝脏中 HG 含量分别是空白对照组 (分别为 236.72±15.20 g/L、9.95±0.32 Ku/L、16.28±0.04 mmol/L、17.61±1.29 mg/g) 的 2.19 倍、1.27 倍、0.26 倍、0.38 倍和 3.05 倍。本研究结果说明柴达木大肥菇 PS、PFB 和 PM 具有抗疲劳作用, 可以提高小鼠的运动耐力、缓解运动疲劳, 且 PM 的抗疲劳效果优于 PS 和 PFB。

关键词: 柴达木大肥菇; 多糖; 力竭游泳; 抗疲劳作用

文章编号: 1673-9078(2018)08-24-30

DOI: 10.13982/j.mfst.1673-9078.2018.8.004

The Anti-fatigue Activities of Polysaccharides Extracted from the *Agaricus Bitorquis* (Quél.) Sacc.Chaidam

JIAO Ying-chun¹, KUANG Hui², WU Jia-nan², HE Cheng-ri³, CHEN Qi-he²

(1.College of Agriculture and Animal Husbandry, Qinghai University, Xining 810016, China)(2.Department of Food Science and Nutrition, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)(3.Food Science Institute, Han Duck Su Pyongyang Light Industry University, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea)

Abstract: In order to study the anti-fatigue activity of the polysaccharides from *Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.Chaidam, polysaccharides were extracted from the sporocarp, fermentation broth and mycelium of *Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.Chaidam by hot water, respectively. Then mice were treated by intragastric administration with three kinds of polysaccharides at the dose of 100 mg/kg for 35 days. After last treatment, mice were forced to swim, and the forced swimming time and the changes of hemoglobin (Hb) level in mice blood, the blood urea nitrogen (BUN), lactate dehydrogenase (LDH) and lactic acid (LA) levels in mice plasma and the hepatic glycogen (HG) level were recorded. The results showed that there were three kinds of fractions in the polysaccharides sporocarp (PS), polysaccharides from fermentation broth (PFB) and polysaccharides from mycelium (PM). In the forced swimming test of mice, the swimming time of mice in PS group, PFB group and PM group were 1.93, 2.33 and 3.03 times higher than that of the control group (29.65±1.92 min), respectively, and the PS, PFB and PM not only could increase the Hb level in mice blood, HG level in mice liver and LDH level in mice plasma, but also could decrease the BUL and LA levels in mice plasma. The PM showed better effects than PS and PFB, and the levels of Hb in mice in mice blood, LDH, BUN, LA in mice plasma and HG in PM group were 2.19, 1.27, 0.26, 0.38 and 3.05 times higher, respectively, than that of control group (236.72±15.20 g/L, 9.95±0.32 Ku/L, 16.28±0.04 mmol/L, 17.61±1.29 mg/g, respectively). These results indicated that the PS, PFB and PM from *Agaricus bitorquis* (Quél.)

收稿日期: 2018-04-02

基金项目: 国家自然科学基金地区项目 (31460391); 青海省国际合作项目 (2018-HZ-801)

作者简介: 焦迎春 (1972-), 女, 教授, 硕士, 研究方向: 食药真菌工程

通讯作者: 陈启和 (1975-), 男, 博士, 教授, 研究方向: 食品生物安全与生物技术

Sacc.Chaidam performed the anti-fatigue activity, improving the exercise endurance and reliving fatigue in exercise, and that the PM showed better anti-fatigue activity than PS and PFB.

Key words: *Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.Chaidam; polysaccharides; forced swimming; anti-fatigue activity

柴达木大肥菇 (*Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.Chaidam) 是青藏高原柴达木盆地特殊生态环境条件下的一种野生大型食用真菌, 营腐生^[1]。子实体肥大, 子实体颜色从白色至暗黄色, 平均重 400 g~800 g, 菌肉肥厚, 味道细嫩鲜美^[2]。菌肉结构紧密、含水量低、耐储运, 很受当地农牧民的喜爱, 被广泛采食和销售。研究表明, 柴达木大肥菇中必需氨基酸含量丰富, 占氨基酸总量的 35.84%, 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维含量分别为 24.0%, 2.10%和 17.32%, 同时维生素 B₂ 和钾、磷、钙和镁等矿质元素含量较高^[3]。

运动性疲劳是一个极其复杂的身体变化综合反应过程, 研究证明在长时间高强度运动中, 糖原耗尽、血糖浓度降低、乳酸堆积、尿素氮积累、运动过程中离子 (如 K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺) 等代谢紊乱、氧自由基的积累等因素都能诱发运动性疲劳的发生^[4]。通过有针对性地补充外源性营养补剂或者药物活性成分来延缓或者防止运动疲劳的发生, 是解决运动性疲劳的有效途径之一。目前相关研究表明, 多糖不仅具有抗氧化、抗肿瘤、抗缺氧和预防心血管疾病等功能^[5,6], 还具有抗疲劳作用^[7]。Du 等^[8]研究发现, 从粒毛盘菌中分离得到的多糖能延长小鼠力竭游泳时间, 具有抗疲劳作用; Li 等^[9]研究发现从玛卡中分离得到的多糖组分 MPS-1 和 MPS-2 均能延长小鼠的游泳时间, 降低小鼠血清中 LA、LDH 和 BUN 水平, 提高 HG 水平, 表明该两种多糖具有抗疲劳作用, 且其抗疲劳活性呈现剂量效应。Ni 等^[10]研究表明, 西藏地区生长的四种药用植物多糖可以延长小鼠力竭游泳时间, 降低血液中葡萄糖水平和超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶活性, 增加血液中尿素氮、甘油三酯、丙二醛水平和乳酸脱氢酶活性, 从而表现出抗疲劳作用。

目前国内外关于柴达木大肥菇的研究较少, 且主要集中在柴达木大肥菇子实体的营养成分分析、菌丝体生物学特性等相关的研究, 而尚未见关于柴达木大肥菇多糖及其生物功能活性的研究。本研究通过采用热水浸提法提取柴达木大肥菇子实体多糖、发酵液多糖和菌丝体多糖, 并研究三种多糖对小鼠力竭游泳时间及力竭游泳结束后小鼠血液中 Hb、血清中 BUN、LDH 和 LA 含量、肝脏中 HG 含量变化的差异性, 研究柴达木大肥菇多糖的抗疲劳作用, 为在青藏高原独特生境下这一野生珍稀食用真菌的进一步开发利用提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验动物

SPF 级昆明种小鼠 (雌雄各半) 购自甘肃中医学院, 体重 26~28 g。饲养环境适宜, 通风, 安静, 温度为 18~25 ℃, 湿度为 35%~50%。

1.1.2 试验材料

野生型柴达木大肥菇子实体和斜面菌种均由青海省农林科学院野生所提供。挑选菇型整齐、发育成熟、无病虫害的子实体进行冻干处理, 得到的干粉冷藏 (4 ℃) 备用。

斜面菌种采用 PDA 斜面在 23 ℃下活化 15 d, 得到的活化菌种 4 ℃下保藏备用。

1.1.3 主要试剂

尿素氮 (BUN)、氰化高铁血红蛋白 (Hb)、乳酸 (LA)、乳酸脱氢酶 (LDH)、肝糖原 (HG) 等试剂盒, 南京建成生物工程研究所; 红景天苷 (纯度>99%), 国药生物制品检定所; DEAE-52 纤维素, 北京鼎国昌盛生物技术有限公司; 葡聚糖系列标准品 (3000、4320、12600、50000 和 110000 u), 北京索莱宝科技有限公司。

1.2 仪器与设备

Agilent 1260 infinity HPLC-GPC 系统, 安捷伦科技有限公司; Agilent G1362A 示差折光检测器, 安捷伦科技有限公司; DHP-9082 电热恒温培养箱, 上海一恒科学仪器有限公司; Eppendorf Centrifuge 5417R 小型台式冷冻型离心机, 德国 Eppendorf 公司; Freezone 2.5 冷冻干燥仪, 美国 Labconco 公司; RV8 旋转蒸发仪, 德国 IKA 公司; 电子天平, 赛多利斯科学仪器有限公司; TU-181 紫外可见分光光度计, 北京普析通用仪器有限公司; SW-CJ-IQ 单人净化工作台, 苏州净化设备有限公司。

1.3 方法

1.3.1 多糖标准曲线制作

采用苯酚-硫酸法测定多糖浓度^[11]。称取干燥至恒重的标准无水葡萄糖 20 mg, 加入 20 mL 蒸馏水, 配制成 1 mg/mL 的葡萄糖溶液。分别吸取 0、0.1、0.2、

0.3/、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9 和 1 mL 葡萄糖溶液,用蒸馏水定容到 1 mL,在 1 mL 多糖溶液中加入 0.5 mL 6%苯酚溶液和 5 mL 浓硫酸,沸水浴中加热 15 min 后冷却,于 490 nm 下测定吸光值。以葡萄糖浓度 (mg/mL) 为横坐标,吸光值为纵坐标,绘制准曲线 $y=0.0121x+0.0564$, $R^2=0.9988$ 。

1.3.2 多糖提取

1.3.2.1 子实体多糖 (PS)

参考文献方法,采用热水浸提法^[12]。按料液比=1:20 (g/mL) (柴达木大肥菇子实体干粉 1 g:蒸馏水 20 mL),于 80 °C 下水浴提取 3 h,离心、浓缩,得到子实体多糖提取物。

1.3.2.2 发酵液多糖 (PFB)

取 1 cm 大小的斜面菌种 2~3 块,接于液体种子培养基中 (100 mL/250 mL 三角瓶,培养基组成为 (g/L): 土豆提取物 200 g,葡萄糖 20 g,蛋白胨 5 g),于摇床避光震荡培养 (20±2 °C, 130±5 r/min) 7~8 d。按照 10% 的接种量将种子液接种于新鲜液体发酵培养基中 (100 mL/250 mL 三角瓶,培养基组成 (g/L): 土豆 200 g,麦芽糖 35 g, CaCl₂ 0.1 g,复合维生素 B 1 g,蛋白胨 5.5 g),放入摇床避光震荡培养 (培养条件同上)^[13]。将发酵液混合体系进行过滤,滤液即为发酵液。按料液比=1:5 (mL/mL) (柴达木大肥菇发酵液 1 mL:蒸馏水 5 mL),于 80 °C 下水浴提取 3 h 后离心浓缩。

1.3.2.3 菌丝体多糖 (PM)

将 1.3.2.2 中液体培养后的发酵液混合体系进行过滤,得到的固形菌丝体用蒸馏水冲洗 3 遍,放入干燥箱中进行烘干,用无菌处理后的研钵将菌丝体研碎,称重。按料液比=1:10 (g/mL) (柴达木大肥菇菌丝体干粉 1 g:蒸馏水 10 mL),于 80 °C 下水浴提取 3 h 后离心浓缩。

1.3.3 多糖处理

脱色:采用活性炭进行脱色^[14]。在 100 mL 多糖液体中加入 6 g 活性炭水浴 (60 °C) 脱色 5 min,边搅拌边脱色。

脱蛋白:Sevage 法脱蛋白^[15]。 $V_{\text{多糖溶液}}:V_{\text{Sevage 试剂}}=1:2$ 配置成混合溶液经过剧烈振摇 20~30 min 脱蛋白, $V_{\text{Sevage 试剂}}:V_{\text{正丁醇}}:V_{\text{氯仿}}=1:5$ 。蛋白质变性后形成凝胶沉淀,通过离心分离后分出水和溶剂层交界处的变性蛋白质。从得到的粗多糖经过脱蛋白后,计算柴达木大肥菇子实体、发酵液、菌丝体中多糖含量分别为:15.25±0.13 g/100 g、11.98±0.09 g/100 mL、48.14±0.11 g/100 g。

纯化:分别称取脱蛋白后的子实体、发酵液、菌

丝体粗多糖 100 mg 溶解于 5 mL 去离子水中,用 DEAE-52 纤维素层析柱层析。用去离子水洗脱,流速 0.5 mL/min,分部收集,每管 5 mL,苯酚-硫酸法检测各管多糖含量 (波长 490 nm 处吸光度),分别收集不同的组分,合并相同组分,50 °C 减压蒸发浓缩,透析 48 h 后将透析液真空冷冻干燥,得纯化后的柴达木大肥菇子实体、发酵液、菌丝体多糖冻干后冷藏,备用。

1.3.4 多糖分子量测定

1.3.4.1 色谱条件

色谱条件:Agilent PL aquagel-OH 40 (8 μm, 300 mm×7.5 mm) 凝胶色谱柱;柱温 35 °C;流动相为纯水;流速 0.8 mL/min;进样量 20 μL。检测器为示差折光检测器 (RID)。

1.3.4.2 多糖标准品分子量大小测定

采用高效凝胶渗透色谱法 (HPGPC) 测定多糖分子量大小。将一系列葡聚糖标准品用流动相溶解,配制质量浓度为 1.0 mg/mL 的系列标准溶液,摇匀,过 0.45 μm 水系纳滤膜后按照 1.3.4.1 中的色谱条件测定系列葡聚糖标品的分子量,以标准品相对分子质量的对数值为纵坐标,以相应色谱峰的保留时间为横坐标进行线性回归,得回归方程 $y=-0.1732x+7.6534$ ($R^2=0.9951$),根据回归方程计算多糖相对分子质量。

1.3.4.3 样品分子量测定

分别将柴达木大肥菇子实体、发酵液、菌丝体多糖用流动相配成质量浓度为 2 mg/mL 的样液,经 0.45 μm 水系滤膜过滤后按照 1.3.4.1 中的色谱条件测定多糖的分子量。根据其保留时间和多糖分子量标准曲线,计算柴达木大肥菇子实体、发酵液、菌丝体多糖的分子量大小。

1.3.5 多糖对小鼠的抗疲劳活性

1.3.5.1 动物分组

将 100 只小鼠随机分为空白组 (Control),红景天苷组 (Rhodiola),子实体组 (PS),发酵液组 (PFB) 和菌丝体组 (PM),每组 20 只,雌雄各半。分别将纯化后的子实体多糖、发酵液多糖和菌丝体多糖中 3 个组分按照自然比例混合,得到纯化后的子实体混合多糖、发酵液混合多糖和菌丝体混合多糖,喂养小鼠。每天在灌胃前两个小时停止喂食,按照 100 mg/kg 的剂量对 5 组实验小鼠分别进行灌胃 35 d,空白组以同等体积的生理盐水进行灌胃。

1.3.5.2 小鼠的力竭游泳实验

参考 West 等^[17]方法,略有改进。在第 35 d 灌胃结束后,60 min 后称量每只小鼠的体重,在水桶 (高 30 cm,直径 25 cm) 内放入一定量的水,水的高度为 20 cm,并保持水温在 25 °C,一桶一鼠。当小鼠头部

露出水面超过 10 s, 同时漂浮不动时视为体力耗竭, 立即记录小鼠游泳时间。

1.3.5.3 生化指标测定

小鼠游泳实验结束后, 立即用乙醚麻醉, 采样, 测定生化指标。

(1) 全血的采集: 采用摘眼球法收集全血, 按照试剂盒说明书检测 Hb 含量。

(2) 血清的采集: 将收集的全血进行低温离心 (4 ℃, 8000 r/min, 10 min), 上清液 (即为血清) 放入 -20 ℃ 冰箱中保存, 按照试剂盒说明书检测血清中 LD、LDH、BUN 含量。

(3) 肝脏的收集: 待全血取出后, 立即将小鼠肝脏取出, 用低温生理盐水漂洗 3 次, 滤纸吸干后称量每只小鼠肝脏重量, 将小鼠肝脏组织放入 -20 ℃ 冰箱中保存, 按照试剂盒说明书检测 HG 含量。

1.4 数据处理

数据以平均值 (x) + 标准差 (SD) 表示, 并分别采用 SPSS 19.0 软件和 Origin 8.5 软件对数据进行处理分析和作图。

2 结果与讨论

2.1 结果

2.1.1 PS、PFB、PM 分子量的测定

由表 1 可知, 从柴达木大肥菇子实体、发酵液和菌丝体中均分离得到 3 种多糖组分, 但 3 种多糖的分子量大小存在差异。在 3 种多糖组分中, 从子实体多糖分离出来的 3 个多糖组分分子量均较大, 其次是菌丝体多糖, 而发酵液多糖组分的分子量相对最小。其中 PS- I、PFB- I、PM- I 所占的比例较大, 其次为

PS- II、PFB- II、PM- II, 而 PS-III、PFB-III、PM-III 所占的比例最小。




图 1 PS (a)、PFB (b)、PM (c) 的 HPGPC 图谱

Fig.1 HPGPC chromatograms of PS (a), PFB (b) and PM (c)

表 1 PS、PFB、PM 分子量的测定

Table 1 Determination of the molecular weights of PS, PFB and PM fractions

	样品								
	PS 组分			PFB 组分			PM 组分		
	PS- I	PS- II	PS-III	PFB- I	PFB- II	PFB-III	PM- I	PM- II	PM-III
Rt/min	18.23	20.63	22.12	23.46	26.57	30.39	19.84	21.12	24.09
Mw/Da	38340	15467	6896	5995	1432	893	30380	9732	3138
所占比例	63.43%	24.46%	12.11%	62.73%	19.46%	17.81%	46.12%	35.51%	18.37%

2.1.2 PS、PFB、PM 对小鼠力竭游泳时间的影响

运动耐力是抗疲劳活性的一个直接反映指标, 小鼠力竭游泳试验被广泛用做检测多糖的抗疲劳活性^[18]。由图 2 可知, 与空白对照组和阳性对照组 (红景天苷组) 相比, 子实体多糖组、发酵液多糖组、菌丝

体多糖组的小鼠力竭游泳时间均显著延长 ($p<0.05$); 3 种多糖组中小鼠力竭游泳时间从大到小的排列顺序为: 发酵液多糖>菌丝体多糖>菌丝体多糖, 且三组之间具有显著差异性 ($p<0.05$)。菌丝体多糖组的小鼠力竭游泳时间最长, 为 89.97 ± 4.38 min, 分别是空白组和红景天苷组小鼠力竭游泳时间的 3.03 倍和 1.81 倍。

发酵液多糖组和子实体多糖组小鼠的力竭游泳时间分别是空白组的 2.33 倍和 1.93 倍。结果表明,柴达木大肥菇子实体、发酵液和菌丝体多糖可以延长小鼠力竭游泳时间,具有抗疲劳活性,且菌丝体的抗疲劳活性优于发酵液多糖和子实体多糖。




图 2 PS、PFB、PM 对小鼠游泳时间的影响

Fig.2 Effect of PS、PFB、PM on the forced swimming time of mice

注:小写字母不同表示差异显著 ($p<0.05$),下同。

2.1.3 PS、PFB、PM 对小鼠血液中 Hb 含量的影响




图 3 PS、PFB、PM 对小鼠血液中 Hb 含量的影响

Fig.3 Effect of PS、PFB、PM on Hb in blood serum of mice

剧烈运动导致机体对氧气的需求量增加,在运动疲劳中,Hb 水平可以作为在机体生理变化的一个重要反映指标^[19]。由图 3 可知,与空白对照组相比,3 种多糖组的小鼠血清中 Hb 含量均有所提高,其中菌丝体多糖组的小鼠血液中 Hb 含量最高 (517.48 ± 101.69 mg/mL),显著大于空白对照 (236.72 ± 15.20 mg/mL) 和阳性对照组 (345.12 ± 15.28 mg/mL)。子实体和发酵液多糖组的小鼠血液中 Hb 含量无显著差异,分别为 (355.32 ± 49.53 mg/mL) 和 (417.87 ± 53.94 mg/mL) ($p>0.05$);子实体多糖组的小鼠血液中 Hb 含量显著高于空白对照组 ($p<0.05$),但发酵液多糖组小鼠血液中 Hb 含量与空白对照组和阳性对照组均无显著差异 ($p>0.05$)。

2.1.4 PS、PFB、PM 对小鼠血清中 BUN、LA

和 LDH 含量的影响

2.1.4.1 PS、PFB、PM 对小鼠血清中 BUN 含量的影响




图 4 PS、PFB、PM 对小鼠血清中 BUN 含量的影响

Fig.4 Effect of PS、PFB、PM on BUN in blood serum of mice

BUN、LA 和 LDH 的变化可以直接反应机体疲劳情况的变化,也可用来评价抗疲劳活性的有效反应指标。在运动耐力过程中,BUN 含量显著下降表明机体能有效缓解运动疲劳^[20]。由图 4 可知,与空白对照组相比 (16.28 ± 0.04 mmol/L),子实体多糖组、发酵液多糖组、菌丝体多糖组和阳性对照组小鼠血清中 BUN 含量均显著下降 ($p<0.05$),且分别下降了 65.78%、69.14%、72.79%和 25.68%。3 种多糖组小鼠血清中 BUN 含量均无显著差异 ($p>0.05$),但均显著高于与阳性对照组 ($p<0.05$)。

2.1.4.2 PS、PFB、PM 对小鼠血清中 LA 和 LDH 含量的影响




图 5 PS、PFB、PM 对小鼠血清中 LA 和 LDH 含量的影响

Fig.5 Effect of PS、PFB、PM on LA and LDH in blood serum of mice

在高强度的剧烈运动中,血清中 LA 含量通常会升高,同时乳酸与运动过程中肌肉力量的减弱和肌肉酸痛的产生密切相关^[21]。LDH 可以催化丙酮酸和乳酸的相互转化,在运动过程中,LDH 活性的增加和 LA 含量的下降有助于缓解运动疲劳,提高运动耐力^[21]。由图 5 可知,与空白对照组相比 (24.32 ± 2.65 mmol/L),3 种多糖组和阳性对照组小鼠血清中 LA 含量均显著

下降($p<0.05$),且分别下降了 25.21%、34.29%、37.34% 和 37.95%;虽然 3 组多糖组与阳性对照组之间均无显著差异($p>0.05$),但多糖组小鼠血清中 LA 含量低于阳性对照组。同时与空白对照组相比,3 种多糖组和阳性对照组小鼠血清中 LDH 活性均显著升高($p<0.05$),且分别升高了 34.47%、38.29%、43.72% 和 27.03%。虽然 3 组多糖组与阳性对照组之间均无显著差异($p>0.05$),但阳性对照组小鼠血清中 LDA 含量低于 3 种多糖实验组,且菌丝体多糖组小鼠血清中 LDA 含量最高,为 $(14.30\pm0.69 \text{ KU/L})$ 。

2.1.5 PS、PFB、PM 对小鼠肝脏中 HG 含量的影响




图 6 PS、PFB、PM 对小鼠肝脏中 HG 含量的影响

Fig.6 Effect of PS, PFB, PM on HG in mice liver

在剧烈运动过程中,除了葡萄糖, HG 是主要的能源物质,增加肝糖原储备有利于提高运动耐力和运动能力^[22]。由图 6 可知,与空白对照组相比($17.61\pm1.29 \text{ mg/g}$),子实体多糖组、发酵液多糖组和菌丝体多糖组的小鼠肝脏中肝糖原的含量显著升高($p<0.05$),且菌丝体多糖组的小鼠肝脏中肝糖原含量最高($127.65\pm18.34 \text{ mg/g}$),显著高于子实体多糖组和发酵液多糖组(分别为 47.14 ± 7.87 、 $53.72\pm0.18 \text{ mg/g}$)($p<0.05$)。子实体多糖组和发酵液多糖组小鼠肝脏中肝糖原含量大于阳性对照组,但无显著差异($p>0.05$)。

2.2 讨论

柴达木大肥菇子实体、发酵液和菌丝体多糖的分子量大小不同,它们的抗疲劳活性具有差异性,该差异性可能与多糖的结构、分子量大小相关。Li 等^[9]研究表明,从玛卡中分离得到的两种多糖(MPS-1 和 MPS-2)平均分子量分别为 $7.6\times10^3 \text{ u}$ 和 $6.7\times10^3 \text{ u}$; MPS-1 是由木糖、阿拉伯糖、半乳糖和葡萄糖组成,而 MPS-2 是由阿拉伯糖、半乳糖和葡萄糖构成;在小鼠的被迫游泳实验过程中,分子量较小的 MPS-2 比 MPS-1 抗疲劳活性更强。

研究表明,多糖的抗疲劳作用机理可能与多糖能

缓解生物体氧化应激损伤有关,相关研究表明,在抗疲劳实验中,多糖会显著影响 MDA、超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽酶(GSH-Px)水平^[23,24]。Wang 等^[24]研究表明,人参与多糖具有抗疲劳作用,可以提高 LDH、肌酸磷酸激酶(CK)、葡萄糖和 MDA 水平,降低血清中 TG 和 GSH-Px 水平,其抗疲劳作用机理可能是通过调节抗氧化酶的活性来减慢脂质氧化过程,从而减弱细胞膜的氧化损害。同时他们推测,血清中 TG 水平的降低和葡萄糖水平的持续升高可能表明运动过程中合成的 TG 被机体不断利用来提供能量,导致糖原和葡萄糖积累,从而可以缓解运动疲劳。在剧烈运动过程中,Hb 含量的升高可以帮助提高小鼠细胞内氧气运输的能力增强,从而提高细胞的有氧呼吸作用^[25]。随着细胞的有氧呼吸作用增强,运动过程中积累的 LA 被消耗或 LA 的合成作用减弱,同时伴随着 LDH 的活性增强和葡萄糖的积累,该过程有利于缓解运动过程中肌肉疲劳和紧张,从而提高运动耐力^[26]。目前对柴达木大肥菇的基础研究比较少,而对柴达木大肥菇活性多糖的生物学功能研究地更少。本研究结果发现柴达木大肥菇多糖具有抗疲劳活性,但是其抗疲劳作用机理还有待深入研究。下一步研究可以从多糖分子结构与抗疲劳活性之间的构效关系、运动过程中脂类代谢、能量代谢、葡萄糖代谢和相关抗氧化酶活性的变化等方面来阐明柴达木大肥菇多糖的抗疲劳作用机理。

3 结论

通过比较柴达木大肥菇子实体多糖、发酵液多糖和菌丝体多糖对小鼠力竭游泳时间及力竭游泳结束后小鼠血液中 Hb、血清中 BUN、LDH 和 LA 含量、肝脏中 HG 含量变化的差异性,结果表明柴达木大肥菇子实体多糖、发酵液多糖和菌丝体多糖通过延长小鼠力竭游泳时间、提高小鼠血液中 Hb、HG 和血清中 LDH 含量、降低小鼠血清中 BUN 和 LA 含量,从而提高小鼠的运动耐力、缓解运动疲劳。说明该 3 种多糖具有抗疲劳作用,且菌丝体多糖的抗疲劳效果优于子实体多糖和发酵液多糖,但是柴达木大肥菇多糖的抗疲劳作用机制还需进一步研究。

参考文献

- [1] 罗春燕.柴达木大肥菇子实体营养成分分析与评价[J].中国食用菌,2015,34(3):25-27
- LUO Chun-yan. Nutrition ingredient analysis and evaluation on *Agaricus bitorquis*(Quél.)sacc. fruit body [J]. Edible Fungi of China, 2015, 34(3): 25-27

- [2] 高淑敏,罗春燕,刘海林.柴达木野生大肥菇菌丝体生物学特性研究[J].中国食用菌,2010,29(5):28-30
GAO Shu-min, LUO Chun-yan, LIU Hai-lin. The biological characteristics of mycelium from *Agaricus bitorquis*(Quél.) sacc. [J]. Edible Fungi of China, 2010, 29(5): 28-30
- [3] 徐鸿雁,刘海林,罗春燕.柴达木盆地野生大肥菇营养生理研究[J].食用菌,2017,39(1):12-15
XU Hong-yan, LIU Hai-lin, LUO Chun-yan. The nutritional physiological characteristics of mycelium from wild *Agaricus bitorquis*(Quél.)sacc. [J]. Edible Fungi, 2017, 39(1): 12-15
- [4] WC Huang, W C Chiu, HL Chuang, et al. Effect of curcumin supplementation on physiological fatigue and physical performance in mice [J]. Nutrients, 2015, 7(2), 905-921
- [5] Smiderle F R, G Alquini, M Tadra-Sfeir, et al. *Agaricus bisporus* and *Agaricus brasiliensis* (1→6)- β -D-glucans show immunostimulatory activity on human THP-1 derived macrophages [J]. Carbohydrate Polymer, 2013, 94(1): 91-99
- [6] X Ji, Q Peng, Y Yuan, et al. Isolation, structures and bioactivities of the polysaccharides from jujube fruit (*Ziziphus jujuba* mill.): A review [J]. Food Chemistry, 2017, 227: 349-357
- [7] Y T Tian, H Zeng, Z Xu, et al. Ultrasonic-assisted extraction and antioxidant activity of polysaccharides recovered from white button mushroom (*Agaricus bisporus*) [J]. Carbohydrate Polymers, 2012, 88(2): 522-529
- [8] Z Du, S Zong, M M Surhio, et al. Strctural characterization and anti-hypoxia activity of an exopolysaccharide isolated from fermentation broth of *Lachnum sp* [J]. Process Biochemistry, 2016, 51(9): 1290-1298
- [9] J Li, Q Sun, Q Meng, et al. Anti-fatigue activity of polysaccharide fractions from *Lepidium meyenii* Walp. (maca) [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2017, 95: 1305-1311
- [10] W Ni, T Gao, H Wang, et al. Anti-fatigue activity of polysaccharides from the fruits of four Tibetan plateau indigenous medicinal plants [J]. Journal of Ethnopharmacology, 2013, 150(2): 529-535
- [11] P He, F Li, L Huang, et al. Chemical characterization and antioxidant activity of polysaccharide extract from spent mushroom substrate of *Pleurotus eryngii* [J]. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2016, 69: 48-53
- [12] G Zhang, Q Yin, T Han, et al. Purification and antioxidant effect of novel fungal polysaccharides from the stroma of *Cordyceps kyushuensis* [J]. Industrial Crops and Products, 2015, 69: 485-491
- [13] L Fan, A T Soccol, A Pandey, et al. Effect of nutritional and environmental conditions on the production of exo-polysaccharide of *Agaricus brasiliensis* by submerged fermentation and its antitumor activity [J]. LWT-Food Science and Technology, 2007, 40(1): 30-35
- [14] 玄光善,李青,王艳波.桦褐孔菌多糖脱色方法及其成分分析[J].食品科学,2014,35(10):207-211
XUAN Guang-shan, LI Qing, WANG Yan-bo. Decolorization and monosaccharide composition analysis of polysaccharides from *Inonotus obliquus* [J]. Food Science, 2014, 35(10): 207-211
- [15] 孙柘,邱涛,袁如月,等.粒毛盘菌多糖脱蛋白方法及其条件优化[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2012,38(4): 519-523
SUN Zhe, QIU Tao, YUAN Ru-yue, et al. Deproteinization method and optimal condition of crude polysaccharide from *Lachnum sp* [J]. Journal of Zhejiang University(Agriculture and Life Sciences), 2012, 38(4): 519-523
- [16] S He, X Wang, Y Zhang, et al. Isolation and prebiotic activity of water-soluble polysaccharides fractions from the bamboo shoots (*Phyllostachys praecox*) [J]. Carbohydrate Polymers, 2016, 151: 295-304
- [17] C H K West, J M Weiss. A selective test for antidepressant treatments using rats bred for stress-induced reduction of motor activity in the swim test [J]. Psychopharmacology, 2005, 182(1): 9-23
- [18] W C Huang, W C Chiu, H L Chuang, et al. Effect of curcumin supplementation on physiological fatigue and physical performance in mice [J]. Nutrients, 2015, 7(2): 905-921
- [19] P B Frappell, T J Schultz, K A Christian. The respiratory system in varanid lizards: determinants of O₂ transfer [J]. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 2002, 133(2): 239-258
- [20] H Zhao, J Li, J Zhang, et al. Purification, *in vitro* antioxidant and *in vivo* anti-aging activities of exopolysaccharides by *Agrocybe cylindracea* [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2017, 102: 351-357
- [21] G A Ribeiro, R H Scola, E J Piovesan, et al. The importance of lactic acid in migraines and fibromyalgia [J]. Revista Brasileira De Reumatologia, 2015, 55(6): 471-476
- [22] D Laurent, B Yerby, B Zhang, et al. Hepatic glycogen cycling contributes to glucose lowering effects of the glucokinase activator LCZ960 [J]. European Journal of Pharmacology, 2013, 715(1-3): 89-95

- [23] J Wang, C Sun, Y Zheng, et al. The effective mechanism of the polysaccharides from *Panax ginseng* on chronic fatigue syndrome [J]. Archives of Pharmacal Research, 2014, 37(4): 530-538
- [24] J Wang, S Li, Y Fan, et al. Anti-fatigue activity of the water-soluble polysaccharides isolated from *Panax ginseng* C. A. Meyer [J]. Journal of Ethnopharmacology, 2010, 130(2): 421-423
- [25] L Mendez, S Ciordia, M S Soledad Fernandez, et al. Changes in liver proteins of rats fed standard and high-fat and sucrose diets induced by fish omega-3 PUFAs and their combination with grape polyphenols according to quantitative proteomics [J]. Journal of Nutritional Biochemistry, 2017, 41: 84-97
- [26] L You, J Ren, B Yang, et al. Antifatigue activities of loach protein hydrolysates with different antioxidant activities [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(50): 12324-12331