

酱油发酵过程中融合魏斯氏乳酸菌促进瓜氨酸的积累

贾爱娟¹, 周凯², 孙远明², 徐振林², 陈元佳², 韦晓群²

(1. 广东美味鲜调味食品有限公司, 广东中山 528437)

(2. 广东省食品质量安全重点实验室/华南农业大学食品学院, 广东广州 510642)

摘要: 氨基甲酸乙酯是一种广泛存在于发酵食品中的 2A 级致癌物, 除了酒类, 发酵豆制品中也有检出。本文以 EC 含量较高的高盐稀态发酵酱油为主要研究对象, 分析了发酵过程中 EC 形成与尿素和瓜氨酸之间的关系, 并探讨了酱油乳酸发酵时期融合魏斯氏乳酸菌(*Weissella confusa*)积累 EC 前体瓜氨酸的情况。结果显示酱油发酵液 pH 为 4.8 时 EC 开始形成, 且与瓜氨酸含量显著相关, 分离该阶段酱醪的乳酸菌发现 *Weissella confusa* 为主要菌株, 其积累瓜氨酸能力差异很大。瓜氨酸在不含 NaCl 培养基中主要在稳定期后释放, 而在含 18%NaCl 培养基中在生长过程中不断积累。盐胁迫是 *Weissella confusa* 积累瓜氨酸的主要原因, 适宜的 pH 和高浓度的葡萄糖也能促进 *Weissella confusa* 积累瓜氨酸。

关键词: 氨基甲酸乙酯; 酱油; 魏斯氏乳酸菌; 瓜氨酸

文章编号: 1673-9078(2018)08-99-104

DOI: 10.13982/j.mfst.1673-9078.2018.8.015

Citrulline Accumulated by *Weissella confusa* during Soy Sauce Fermented Process

JIA Ai-juan¹, ZHOU Kai², SUN Yuan-ming², XU Zhen-lin², CHEN Yuan-jia², WEI Xiao-qun²

(1. Guangdong Meiweixian Flavoring Food Co., Ltd. Zhongshan 528437, China)(2. Guangdong Provincial Key Laboratory of Food Quality and Safety, College of Food Science, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

Abstract: Ethyl carbamate (EC), a widespread by-product in fermented food, was classified as a group 2A carcinogenic compound, in addition to the occurrence of alcoholic beverages, EC can be found in fermented soybean products. In this work, the correlations of EC with urea and citrulline in soy sauce during fermentation were analyzed. Furthermore, the effects of *Weissella confusa* on the citrulline accumulation were discussed. Results showed that EC in soy sauce fermented liquor was formed when the pH was about 4.8, there was a significant correlation of citrulline with EC content. Lactic acid bacteria were isolated from moromi mash during this stage, and *Weissella confusa* was the main lactobacillus, but their citrulline accumulation abilities were different. Citrulline accumulated stages of *Weissella confusa* in the medium with or without 18% NaCl are after stationary phase and the whole growing time respectively. The ability to accumulated citrulline by *Weissella confusa* was activated by saline stress, the optimal pH and high concentrate of glucose accelerated the citrulline accumulation.

Key words: ethyl carbamate; soy sauce; *Weissella confusa*; citrulline

氨基甲酸乙酯(EC), 又称尿烷, 是一种广泛存在于发酵食品中的 2A 级致癌物(国际癌症研究机构, 2007 年), 能够直接导致人类产生肝癌^[1,2], 主要在发酵、蒸馏、灭菌和贮藏等过程形成^[3]。早在 2002 年 EC 被联合国粮农组织纳入重点监控物质, 推荐发酵食品中 EC 含量不超过 20 $\mu\text{g/L}$ ^[4]。在我国和其他一些

亚洲国家, 发酵酱油是一类重要的食品调味料^[5], Park 在研究中指出, 酱油是摄入 EC 的主要发酵食品, 虽然致癌风险较低, 但对于长期大量食用人群, 需要保持警惕^[6,7]。因此迫切需要准确了解发酵酱油中 EC 主要前体物质, 并对形成主要前体物质的因素进行有效控制。

历年来广东是我国酱油的主要生产和出口地区^[8]。以“日晒夜露”特色生产的高盐稀态发酵酱油因其发酵时间长风味醇香而成名。然而, 由于独特的原料和发酵方式, 很容易形成大量 EC。酱油中 EC 的主要前体物质是酒精和瓜氨酸^[9], 分别在酵母发酵阶段和

收稿日期: 2018-04-13

基金项目: 广东省科技计划项目 (2015B020205002); 中山市调味品研发协同创新中心 (16C1013); 阳江市科技计划项目 (2016052)

作者简介: 贾爱娟 (1974-), 女, 高级工程师, 研究方向: 发酵调味品技术

通讯作者: 徐振林 (1982-), 男, 博士, 教授, 研究方向: 食品安全

乳酸菌发酵阶段大量产生^[10]。由于酒精有助于酱油独特的酱香味,控制 EC 的方法主要集中于控制瓜氨酸形成^[11]。瓜氨酸是一种非蛋白质氨基酸,主要由微生物通过精氨酸脱氨基途径(ADI)形成^[1]。ADI 途径只存在于少数原核生物中,酱油中的鲁氏结合酵母并不能产生瓜氨酸^[12]。在酱油发酵过程中,前期发酵的曲霉以及随后使发酵液 pH 降低的乳酸菌可能成为瓜氨酸的主要来源。Zhang 认为^[10], *Pediococcus acidilactici* 是酱油中瓜氨酸的主要来源,但在酱油发酵过程中, *Weissella* 和 *Candida* 是优势菌株^[13]。因此有必要深入了解酱油中的 *Weissella* 消耗精氨酸积累瓜氨酸的情况。

本研究以高盐稀态发酵酱油为主要研究对象,分离了酱油乳酸发酵阶段乳酸菌,确定了对瓜氨酸积累情况,并考察了环境因素 *Weissella confusa* 积累瓜氨酸的影响。为寻求有效的方法降低酱油中瓜氨酸积累,减少酱油中 EC 的产生提供参考。

1 材料与方法

1.1 原料和试剂

酱油曲料、酱醪和酱油发酵液来源于广东美味鲜调味食品有限公司和番禺东海调味食品有限公司两个酱油制造厂,均为高盐稀态发酵酱油,原料取回后均保存于 4℃ 冰箱。

氨基甲酸乙酯(EC, 99%)、9-占吨醇(98%)、氨基甲酸丁酯(BC, 98%)、尿素(99%)、巴比妥酸、吡啶均为分析纯,购买于上海阿拉丁试剂公司。乙酸乙酯、乙醚、二氯甲烷为色谱纯,购买于 RCI Labscan 公司(泰国)。氢氧化钠、无水硫酸钠和盐酸等其他常用试剂购买于天津希恩思生化有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 氨基甲酸乙酯的测定

氨基甲酸乙酯的分离和检测参考国标 5009.223-2014 并稍作修改,采用 VF-WAX(30 m×0.25 mm, 0.25 μm)色谱柱,气相色谱质谱型号为 Agilent 7890A-5975C(美国),色谱参数设置为:氦气为载气,流速为 1.0 mL/min 进样口温度为 220℃,气体洗脱程序设置为初始温度 50℃,保持 1 min,以 8℃/min 加热至 180℃后再以 40℃/min 加热至 240℃,保持 5 min,不分流进样,进样量为 1.0 μL。质谱参数设定为:采用点喷雾离子源,电子能量 70 eV,离子源温度为 230℃采用 SIM 模式扫描,特征离子为 62、74 和 89,为了提高灵敏度选择 62 为定量离子。

样品前处理参考国标 5009.223-2014 和 Huang^[14]并稍做修改。量取 2 mL 酱油及其发酵液并加入 100 μL BC 内标(1 μg/mL)混合均匀,EC 提取和纯化采用固相萃取法,使用 CNWBOND 固相萃取小柱(上海安普),先用正己烷润洗,将样品溶液加入萃取柱中,静置 10 min,用正己烷淋洗后,再用乙酸乙酯-乙醚(V/V=5:95)洗脱。将上述所得的萃取液和洗脱液收集到离心管后用氮吹仪浓缩至干,采用二氯甲烷后充分混匀溶解后定容至 1 mL,经 0.22 μm 的有机滤膜后供 GC-MS 分析。

1.2.2 尿素和 pH 测定

尿素含量采用轻工业行业标准 QB/T 4710-2014 进行测定,取稀释后的样品 600 μL,加入 400 μL 的 9-羟基吨氢醇(0.02 mol/L,溶于正丙醇)衍生化试剂,并加入 100 μL 1.5 mol/L 的盐酸溶液,漩涡震荡 1 min,避光在 25℃ 下反应 30 min,反应液经 0.45 μm 有机滤膜过滤后供高效液相色谱法色谱结合荧光检测器分离检测。以保留时间定性,采用峰面积外标法定量。色谱柱选择 ZORBAX SB-C18 柱,柱温 35℃,进样量 10 μL。荧光检测器激发波长为 240 nm,发射波长为 308 nm。采用 PHS-25 型 pH 计测定发酵液的 pH 值,测定前将发酵液放置于 25℃ 水浴中放置 20 min 使温度达到平衡。

1.2.3 瓜氨酸和精氨酸测定

瓜氨酸和精氨酸的含量参考 Zhou^[15]的方法利用分光光度法稍加修改。精氨酸测定:将 40 g/L NaOH、80 g/L 甲萘酚和 0.5 mL/L 双乙酰(用正丙醇溶解)各 1 mL 加入 10 mL 比色管中,然后加入 100 μL 适当稀释的样品(或标准溶液),混匀后在 30℃ 水浴中保温 15 min,冷却室温后测 OD₅₄₀,对应标准曲线中计算出精氨酸含量。瓜氨酸测定:将 2 mL 稀释的样品加入 1 mL 混合酸(V/V=1:3),加入 30 g/L 二乙酰-一肟 0.125 mL,混匀后避光沸水浴 30 min,继续避光冷却室温后侧 OD₄₉₀,对应标准曲线中计算出瓜氨酸含量。

1.2.4 酱油中乳酸菌的分离和鉴定

将发酵酱醪用 0.85% 的生理盐水梯度稀释,取 100 μL 涂布于 MRS 固体培养基中并置 30℃ 培养箱中培养直至有单菌落出现,将外观不同的菌落挑出并划线纯化数次,用 20% 的甘油保存于 -80℃ 冰箱中。将纯化的菌株培养至 OD₆₀₀ 为 1 时分别接种至两种含有和不含 18% NaCl 的改良 MRS 液体培养基(加入了 10 g/L 精氨酸)中,置于 30℃ 培养 24 h。离心后测定上清液中瓜氨酸和精氨酸含量。细菌基因组 DNA 提取试剂盒(天根)步骤提取分离得到的菌株细菌基因组产物并送北京睿博兴科生物技术有限公司进行 16s rDNA 测

序分析。并在 National Center for Biotechnology Information 数据库(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/)上在线比对。

1.2.5 *Weissella confusa* 积累瓜氨酸的规律

挑选一株能够大量积累瓜氨酸的 *Weissella confusa*, 分别接种至 50 mL 的两种含有和不含 18%NaCl 的改良 MRS 液体培养基(加入了 10 g/L 精氨酸), 不含有 18%NaCl 的培养基在 30 °C 中静置培养 24 h, 含有 18%NaCl 的培养基在 30 °C 中静置培养 48 h, 分别定时取样测定 OD 值和上清中的精氨酸和瓜氨酸含量。将该菌株培养至 8 log cfu/mL 后取 1 mL 接种至 9 mL 改良的 MRS 培养基(含 10 g/L 精氨酸)中: 不同的 NaCl 浓度 6%、9%、12%、15%和 18%; 不同 pH 4、4.6、5.4、6.2; 不同葡萄糖 0、20、40、80 g/L; 不同尿素添加量 5、10、20、40 mg/L; 不同乙醇含量 0.5%、1%、2%、4%。培养结束后测定上清液中精氨酸与瓜氨酸含量。其中不同 pH 组外, 其余实验组均通过乙酸将 pH 调节至为 6.2。除了不同的 NaCl 浓度组需要在 30 °C 培养 48 h, 其他组均培养 24 h。

1.2.6 数据统计分析

每组实验分别重复三次。采用 SPSS statistics 19 分析软件中的 ANOVA 程序对结果进行差异性显著分析。所有数据作图均采用 origin 8.0 软件作图。

2 结果与讨论

2.1 酱油发酵过程中 EC 与前体物质生成情况




图1 酱油发酵过程中 EC 与尿素和瓜氨酸的相关性

Fig.1 The relative of EC with urea and citrulline during soy sauce fermentation

通过对番禺和中山两个酱油厂的酱油发酵液中的 EC 含量进行监控, 同时也在实验室模拟酱油发酵过程, 发现 EC 在整个酱油发酵阶段含量非常低(低于 8 μg/L)。通过对比发现, 发酵过程中 EC 与瓜氨酸相关性较高, 相关系数达 0.72, 而尿素与 EC 的相关性很低(无法拟合, 图 1)。虽然酱油中 EC 大量形成于淋油

和灭菌阶段^[16], 但主要 EC 前体物质瓜氨酸却在发酵前期的乳酸发酵过程中大量积累^[10,17]。EC 最早出现在 pH 约为 4.8 时(图 1 圆圈处), 此时乳酸发酵临近结束, 乙醇开始积累。在此过程中, 酱油中的主要微生物为曲霉和乳酸菌。由于未在酱油曲料中检测到 EC 和瓜氨酸, 因此认为曲霉新陈代谢并不能提供形成 EC 的主要前体物质瓜氨酸。

2.2 乳酸菌分离与瓜氨酸积累情况




图2 酱油中分离的乳酸菌在不含(a)和含有(b)18%NaCl 的 MRS 培养基(含 10 g/L 精氨酸)培养 24 h 后利用精氨酸积累瓜氨酸的能力

Fig.2 The arginine consumption and citrulline accumulation capacity of lactic acid bacteria isolated from the high-salt liquid-state fermented soy sauce

利用 MRS 固体培养基分离 pH 约为 4.8 中的酱醪中乳酸菌, 通过对比菌落特征共得到 34 株菌, 菌株鉴定结果与 Sulaiman 基本一致^[13]。图 2 显示分离得到的乳酸菌在含有和不含 18%NaCl 的 MRS 液体培养基中利用精氨酸积累瓜氨酸的情况。显然 18%NaCl 胁迫下, 乳酸菌积累瓜氨酸能力显著提高^[10], 精氨酸到瓜氨酸的转化率提高了 1~14 倍。根据能否大量利用和基本不利用精氨酸将得到的乳酸菌大致分成两类, 基本不能利用精氨酸的菌株全部为 *Leuconostoc garlicum*, 这类乳酸菌虽然在含有与不含 18%NaCl 的培养基中均具有较高的瓜氨酸转化率, 但利用精氨酸能力均很差, 积累瓜氨酸能力很有限, 即使在

18%NaCl 的胁迫下, 积累的瓜氨酸含量均没有超过 140 mg/L。另一类能大量消耗精氨酸, 根据积累瓜氨酸情况也分成两类: 一类积累少量瓜氨酸, 主要为 *Weissella confusa* (5 号和 34 号)、*Weissella cibaria*、*Enterococcus faecium*、*Weissella sp* 和 *Bacillus velezensis*。另一类是大量积累瓜氨酸的菌株, 主要有 *Pediococcus acidilactici*、*Weissella confusa*、*Leuconostoc sp*、*Sphingomonas echinoides* 和 *Rummeliibacillus stabekisii*。其中 *Pediococcus acidilactici* 能够在 18% NaCl 的培养基中积累最多的瓜氨酸(1682 mg/L), 且转化率达到 17.18%, 但数量很少。*Weissella confusa* 检出数量最多, 均能大量利用培养基中的精氨酸, 但积累瓜氨酸的能力差别很大, 其中 5 和 34 号的 *Weissella confusa* 在不含 NaCl 的培养基中利用精氨酸能力很差但在 18% NaCl 的培养基中能高效利用精氨酸且不积累瓜氨酸, 而除 5 和 34 号的其他 *Weissella confusa* 在 MRS 培养基中均能大量利用精氨酸, 在高含量的 NaCl 胁迫下积累瓜氨酸能力显著提高。

2.3 *Weissella confusa* 生长过程中对瓜氨酸积累情况





图3 *Weissella confusa* 在不含 (a) 和含有 (b) 18%NaCl 的 MRS (10 g/L 精氨酸) 培养基中消耗精氨酸和利用瓜氨酸的情况

Fig.3 The arginine consumption and citrulline accumulation ability of *Weissella confusa* in cultivating with (a) and without (b) 18%NaCl MRS Medium

图 3 是将挑选的一株 *Weissella confusa* 在最佳外界条件下培养, 分别在不同时间内测定上清液中精氨酸和瓜氨酸的情况。由图可以看出, 在没有 18%NaCl 胁迫下, *Weissella confusa* 在对数生长期对精氨酸消耗量急剧增加, 一方面能够满足菌体自身新陈代谢和繁殖, 一方面利用 ADI 途径产物减缓环境 pH 值的降低^[18]。由于环境适合, 精氨酸含量高, 精氨酸到瓜氨酸的转化率在对数生长期变化较小, 而在培养 24 h 后, 上清液瓜氨酸含量才显著升高。而 18%NaCl 胁迫显著抑制了 *Weissella confusa* 生长, 瓜氨酸在整个生长过程中均在积累, 且转化率都在 20% 以上。研究认为^[15], 盐是导致细胞内 *arcB* 基因转录水平相对于 *arcA* 减少从而造成瓜氨酸转化率提高。而瓜氨酸的释放机制却不清楚。在本实验室, 推测瓜氨酸在没有盐胁迫下主要由后期细胞衰亡过程中释放到环境中从而积累, 在有高浓度盐胁迫下, 积累的瓜氨酸能够持续的释放至细胞外。

2.4 环境因素对魏斯氏菌株积累瓜氨酸的影响

分别考察了盐、pH、葡萄糖、乙醇和尿素含量对 *Weissella confusa* 消耗瓜氨酸积累精氨酸的影响。结果显示 NaCl 添加量是 *Weissella confusa* 转化率超过 10% 的唯一因素, 也是积累瓜氨酸的最主要的因素, 这也和 *P. acidilactici* 结果一致^[10], 但是, NaCl 添加量为 9% 时, 虽然精氨酸消耗量与 6%NaCl 时相近, 但此时瓜氨酸显著增加至最大, 转化率也为最高的 58.5%。随后随着盐浓度的增加, *Weissella confusa* 生长受到抑制, 消耗精氨酸能力下降, 转化率也随之下降, 但在 18%NaCl (酱油发酵时含盐量) 的培养基下, 转化率升高但瓜氨酸积累依然降低, 此时瓜氨酸积累量为 1333.54 mg/L。 *Weissella confusa* 在含 12%~18% NaCl 培养基下最终菌的数量基本一致, 但精氨酸到瓜氨酸转化率在 15%NaCl 时最小, 此时单位菌体利用精氨酸能力不是最弱, 但消耗瓜氨酸能力强。






图4 *Weissella confusa* 在不同条件下消耗精氨酸和利用瓜氨酸的情况

Fig.4 The ability of *Weissella confusa* to consume arginine and accumulate citrulline in different conditions

推测在该盐浓度对 *Weissella confusa* 的 ADI 途径中精氨酸脱亚氨基酶(ADI 酶)抑制强于 12%NaCl, 但对鸟氨酸转氨甲酰基酶(OTC 酶)抑制又弱于 18%NaCl, 导致此时 ADI/OTC 酶活比例降至最低^[12], 因此 15%盐浓度可做为降低 *Weissella confusa* 精氨酸

到瓜氨酸转化率的重要因素之一。在 pH 为 4.8 时, *Weissella confusa* 消耗精氨酸能力最强转化率也最高, 这也和分离的酱醪 pH 一致, 且为该菌积累瓜氨酸的最佳 pH, 但在 pH 为 4 时, *Weissella confusa* 生长受到抑制, 转化率不到 1%。

葡萄糖对 *Weissella confusa* 积累瓜氨酸影响较大, 虽然糖代谢和精氨酸的代谢相互独立, 但实验显示高浓度的葡萄糖能够提高精氨酸到瓜氨酸的转化率和瓜氨酸浓度, 可能的原因是: (a)提高了菌株生长速率, 使得稳定期提前; (b)也可能是影响了环境的 pH, 从而影响菌体的转化率^[19]; (c)葡萄糖氧化形成的大量 ATP 抑制了 ADI 途径在酸拮抗下产生 ATP, 导致瓜氨酸的积累^[20]。由于酱油发酵时乙醇含量和尿素含量很低, 这两者对 *Weissella confusa* 消耗精氨酸与积累瓜氨酸均没有显著影响。在 2%乙醇浓度和 10%的尿素存在下, 精氨酸到瓜氨酸的转化率为最高。

3 结论

3.1 高盐稀态发酵酱油在发酵过程中 EC 最早出现在发酵液 pH 为 4.8 时, 此时瓜氨酸大量积累, 整个发酵过程中 EC 与瓜氨酸的相关性远高于尿素, 证实了瓜氨酸才是酱油中主要的 EC 前体物质。制曲过程没有检测到瓜氨酸积累和 EC 形成。

3.2 分离得到的乳酸菌主要分成三类。一类是不能大量消耗精氨酸同时瓜氨酸积累量很小, 全部是 *Leuconostoc garlicum*; 另外两类能大量消耗精氨酸, 但积累瓜氨酸能力差异很大, 除了先前报道的 *Pediococcus acidilactici* 能大量积累瓜氨酸外, *Weissella confusa* 是分离得到的优势菌株, 大部分能够在 18%NaCl 培养基中大量积累瓜氨酸。

3.3 盐胁迫是 *Weissella confusa* 积累瓜氨酸的主要因素, 在含 18%NaCl 培养基中在生长过程中不断积累。*Weissella confusa* 在 9%NaCl 存在下, 精氨酸到瓜氨酸的转化率达到最高, 瓜氨酸积累最多。pH 4.8 和高浓度的葡萄糖能够提高精氨酸到瓜氨酸的转化率并积累更多的瓜氨酸。因此, 消除此类乳酸菌在盐胁迫下积累瓜氨酸的能力或将产生的大量瓜氨酸转化掉将有助于高盐稀态发酵酱油中 EC 含量控制。

参考文献

- [1] Cadranet J, Legendre C, Desaint B, et al. Liver disease from surreptitious administration of urethane [J]. Journal of Clinical Gastroenterology, 1993, 17(1): 52-56
- [2] Liu Hui-chang, Cui Bo, Xu Yi, et al. Ethyl carbamate induces cell death through its effects on multiple metabolic pathways

- [J]. Chemico-Biological Interactions, 2017, 277: 21-32
- [3] Jiao Zhi-hua, Dong Ya-chen, Chen Qi-he. Ethyl carbamate in fermented beverages: presence, analytical chemistry, formation mechanism, and mitigation proposals [J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2014, 13(4): 611-626
- [4] Wu Hong-miao, Chen Li, Pan Guo-shao, et al. Study on the changing concentration of ethyl carbamate in yellow rice wine during production and storage by gas chromatography/mass spectrometry [J]. European Food Research and Technology, 2012, 235(5): 779-782
- [5] Lee B, Khor S. 3-Chloropropane-1, 2-diol (3-MCPD) in soy sauce: A review on the formation, reduction, and detection of this potential carcinogen [J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2015, 14(1): 48-66
- [6] Park S, Ha S, Yoon J, et al. Exposure to ethyl carbamate in alcohol-drinking and nondrinking adults and its reduction by simple charcoal filtration [J]. Food Control, 2009, 20(10): 946-952
- [7] Choi B, Ryu D, Kim C, et al. Probabilistic dietary exposure to ethyl carbamate from fermented foods and alcoholic beverages in the Korean population [J]. Food Additives & Contaminants: Part A, 2017, 34(11): 1885-1892
- [8] 杨邦忠.关于酱油质量的鉴别分析[J].中外食品工业月刊, 2014,5:27-29
YANG Bang-zhong. Quality analysis of soy sauce [J]. Global Food Industry, 2014, 5: 27-29
- [9] Zhou Kai, Liu Yao, Li Wen-qian, et al. An improved HPLC-FLD for fast and simple detection of ethyl carbamate in soy sauce and prediction of precursors [J]. Food Analytical Methods, 2017, 10(12): 3856-3865
- [10] Zhang Ji-ran, Fang Fang, Chen Jian, et al. The arginine deiminase pathway of koji bacteria is involved in ethyl carbamate precursor production in soy sauce [J]. FEMS Microbiology Letters, 2014, 358(1): 91-97
- [11] Zhang Ji-ran, Du Guo-cheng, Chen Jian, et al. Characterization of a *Bacillus amyloliquefaciens* strain for reduction of citrulline accumulation during soy sauce fermentation [J]. Biotechnology Letters, 2016, 38(10): 1723-1731
- [12] 张继冉,方芳,陈坚,等.鲁氏接合酵母对酱油中氨基甲酸乙酯前体物的代谢[J].微生物学报,2016,56(6):956-963
ZHANG Ji-ran, FANG Fang, CHEN Jian, et al. Metabolism of ethyl carbamate precursors in soy sauce by *Zygosaccharomyces rouxii* ZQ02 [J]. Acta Microbiologica Sinica, 2016, 56(6): 956-963
- [13] Sulaiman J, Gan H, Yin W, et al. Microbial succession and the functional potential during the fermentation of Chinese soy sauce brine [J]. Frontiers in Microbiology, 2014, 5: 556
- [14] Huang Zhu, Pan Xiao-dong, Wu Ping-gu, et al. Validation (in-house and collaborative) of the quantification method for ethyl carbamate in alcoholic beverages and soy sauce by GC-MS [J]. Food Chemistry, 2013, 141(4): 4161-4165
- [15] Zhou Wan-yi, Fang Ruo-si, Chen Qi-he. Effect of gallic and protocatechuic acids on the metabolism of ethyl carbamate in Chinese yellow rice wine brewing [J]. Food Chemistry, 2017, 233: 174-181
- [16] Matsudo T, Aoki T, Abe K, et al. Determination of ethyl carbamate in soy sauce and its possible precursor [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1993, 41(3): 352-356
- [17] Fang Fang, Zhang Ji-ran, Zhou Jing-wen, et al. Accumulation of citrulline by microbial arginine metabolism during alcoholic fermentation of soy sauce [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, 66(9): 2108-2113
- [18] De Angelis M, Mariotti L, Rossi J, et al. Arginine catabolism by sourdough lactic acid bacteria: purification and characterization of the arginine deiminase pathway enzymes from *Lactobacillus sanfranciscensis* CB1 [J]. Applied and Environmental Microbiology, 2002, 68(12): 6193-6201
- [19] Vrancken G, Rimaux T, De Vuyst L, et al. Kinetic analysis of growth and sugar consumption by *Lactobacillus fermentum* IMDO 130101 reveals adaptation to the acidic sourdough ecosystem [J]. International Journal of Food Microbiology, 2008, 128(1): 58-66
- [20] Konings W, Poolman B, Driessen A, et al. Bioenergetics and solute transport in *lactococci* [J]. CRC Critical Reviews in Microbiology, 1989, 16(6): 419-476